

H2-接受體拮抗劑

“汎生” 護胃素 注射液 10 毫克／毫升

Forgas Injection 10mg/ml “Panbiotic”

衛署藥製字第 034076 號 G-2377

[主成分]

每 mL 含有：Famotidine.....10mg

[賦形劑]

L-Aspartic acid、Mannitol、Benzyl alcohol、Water for injection add to...1.0mL

[藥效藥理]

1. 護胃素 Forgas 直接阻斷 Histamine 在胃中壁細胞上之 H2-接受體的作用，藥理實驗證實本品對組織胺、胃泌素、迷走神經、胰島素、食物、咖啡鹼所引起的胃酸分泌，均能有效控制，20mg 靜脈注射，對於基礎分泌，Tetragastrin, Betazole 刺激分泌皆會抑制。
2. 護胃素可以二十四小時持續性抑制胃酸分泌，十二小時的胃酸分泌抑制率為 93% 以上，胃內 pH 值在投藥後一小時達到四以上，至十二小時達到 5 ~ 6 的範圍，夜間分泌對胃酸及 Pepsin 分泌量各有 91% ~ 71% 被抑制。
3. 護胃素投與較迷走神經切除術更能有效的控制胃酸分泌。
4. 護胃素可促進胃黏膜的完整性，增加抵抗力。0.1 ~ 0.2 mg/kg 靜脈注射，有增加正常人胃黏膜血流傾向，對十二指腸潰瘍患者之胃液中黏液物質濃度無影響。
5. 除了在治療胃，十二指腸潰瘍外，臨床上亦證實本品對急性糜爛性胃炎所致的上胃腸道出血，甚具療效。

[適應症]

住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的) 十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。

[用法用量]

通常成人，一次 20 ~ 40mg，一天兩次(間隔十二小時)緩慢 IV，亦可混於輸液中 IV。

本藥限由醫師使用。

注意事項：

1. 一般應注意：

治療過程中，應充分的觀察，依其病情，使用其治療上所必要之劑量，倘使用本劑未能達到預期效果時，請更換其他療法。

2. 對下列病人，應慎重投與：

- (1) 以前有發生過藥物過敏症的病人。
- (2) 患有腎不全的病人。
- (3) 患有肝障礙之病人。

3. 副作用：

- (1) 過敏症：偶有發疹、皮疹、蕁麻疹(紅斑) 出現，如有上述情形出現，請即停止投藥。
- (2) 血液：有白血球減少之傾向出現。
- (3) 消化系統：間有便秘、下痢、軟便、口渴、噁心、嘔吐、偶有腹脹、食慾不振。
- (4) 循環系統：偶有心跳增加，血壓上升、顏面潮紅、耳鳴。
- (5) 肝臟：間有 S-GOT、S-GPT 上升等肝機能異常。
- (6) 精神神經系：間有倦怠無力感，偶有頭痛、頭重感。
- (7) 其他：偶有月經不順，顏面浮腫。

4. 對妊娠、授乳婦的投與：因有關懷孕中投與之安全性尚未建立，故對可能懷孕婦女或妊娠不予使用，本品會被分泌至母乳中，注意避免授乳。

5. 對小兒的投與，對小兒使用，其安全性尚未建立。

6. 使用上應注意(注射劑)：為避免切割安瓿時，玻璃碎片的混入，請先用沾有酒精的棉花等清拭後，才切割。

7. 其他：本劑之投與，因有可能隱蔽胃痛之症狀，應確認其為非惡性者再投與。

[包裝貯存]：2 毫升、4 毫升/安瓿，100 支以下盒裝。

置於陰涼處(25°C 以下)避光貯存。



臺灣汎生製藥廠股份有限公司

高雄縣鳥松鄉大同路 5-1 號 電話：(07)7317861