WZT-004
衛署藥製字第034120號
Code No.:38216

YSP®

消化性潰瘍治療劑

胃吉®

錠 500公絲

（斯克拉非）

Weizip®

Tablets 500mg

(Sucralfate)

3.98cm

長久以來，人們一直將胃酸視爲導致消化性潰瘍的唯一誘因，但隨著臨床研究的深入探討發現消化性潰瘍其實乃是一種由於胃腸防禦因子與攻擊因子之間的平衡失調所導致的消化性胃腸疾病。因此，降低攻擊因子或強化防禦因子，均是治癒消化性潰瘍的不二法門。自從1962年一群研究人員在動物試驗中發現許多合成性硫酸鹽多醣類(Synthetic sulfate polysaccharides)具有明顯的抗潰瘍作用後，消化性潰瘍的治療便進入了革命性的時代。

本藥是一種局部治療性之細胞保護性藥劑，就化學上而言，本藥爲一種蔗糖硫酸鹼性鋁鹽(Basic aluminum salt of sucrose sulfate)，可有效增加細胞防禦能力，促使消化性潰瘍的治療更加落實。

【成　　分】每錠中含：

Basic Aluminum Sucrose Sulfate (Sucralfate).....500mg

【賦　形　劑】

Hydroxypropyl cellulose、Microcrystalline Cellulose、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Aluminosilicate。

【作　　用】

1. 本藥爲局部性保護細胞的消化性潰瘍治療劑，其可選擇性地吸附於受損的黏膜上，形成保護層，以增加黏膜的防禦能力。
2. 本藥可與細胞表面的蛋白質形成一種複合物，而附著於潰瘍黏膜區，防止黏膜的繼續受損。
3. 本藥與白蛋白形成之保護膜(Sucralfate-albumin film)可有效阻止胃酸及胃蛋白酶擴散至潰瘍黏膜區。
4. 本藥可與保護新形成的黏膜細胞而不被膽汁、酒精、阿斯匹林及其他抗發炎藥劑所瓦解。

【適　應　症】

胃潰瘍及十二指腸潰瘍。

【用法．用量】

通常成人每次二錠，一日3至4次；與早、午、晚餐前一小時及就寢時服用。

本藥須由醫師處方使用。

【禁　忌　症】

尚未發現使用Sucralfate有任何禁忌症。

【一 般 注 意】

1. **十二指腸潰瘍為一種慢性．復發性疾病。因此，經短期Sucralfate治癒的十二指腸潰瘍乃有復發或再度惡化的可能。**
2. **本藥應謹慎使用於慢性腎衰竭或正接受透析治療的患者，以免引起過度的鋁離子蓄積。**
3. **由於本藥會引起下列併服藥物的口服吸收量（生體可用率）的降低：(Cimetidine, Ciprofloxacin, Digoxin, Ketoconazole, Norfloxacin, Phenytoin, Ranitidine, Tetracycline及Theophylline。因此，前述藥物宜於本藥投與前2小時給予之。**
4. **腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。**

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副　作　用】

本藥耐受性良好，便秘為較常見之不良反應，其他偶發之副作用則包括：下痢、噁心、嘔吐、胃部不適、消化不良、腹脹、口乾、搔癢、皮膚疹、眩暈、失眠、思睡、耳鳴、背痛及頭痛現象等。

【保存上之注意】

1. **本藥應置於小兒伸手不及處。**
2. **於25℃以下儲存。**
3. **請在有效期限內使用。**

【包　　裝】

12～1000錠罐、塑膠瓶、鋁箔盒裝。

YUNGSHIN®

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電　　話：（04）26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2146690