

制酸  
“世達” 達康錠 500 毫克  
(碳酸鈣)  
Dacon Tablets 500 mg “S.D.”  
(Calcium Carbonate)




衛署藥製字第 034241 號 (G-2468)

[序文]

碳酸鈣是一種制酸劑 <Antacid>。

18



[成分] 每錠中含：

Calcium Carbonate ..... 500 mg

[適應症]

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

[用法用量]

一天 3 次，或需要時服用；應嚼碎後吞服。成人每次 2 錠，12 歲以上，適用成人劑量。6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。3 歲以上未滿 6 歲，適用成人劑量之 1/4。3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

單次劑量(2 錠)之酸中和能力不少於 18 mEq。

注意事項

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

警語

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  1. 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5g。
  2. 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
  3. 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
  4. 制酸劑不得併用其他藥品。
- 二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四、本藥含鈣之制酸成分，可能引起便祕或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- 五、本藥含碳酸鹽之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。

禁忌症：甲狀腺功能低下及副甲狀腺功能亢進者。

慎重給藥：嚴重心肺機能障礙症，嚴重腎障礙症，便祕及高血鈣症患。

副作用：

1. 若有代謝性異常如高鈣血、鹼血症出現則應減量或停藥。
2. 大量且長期服用有發生腎結石、尿道結石症狀。
3. 消化道偶有噁心、便祕及反彈性胃酸分泌。

藥物配合：

1. 可能抑制四環素之吸收。
2. 本劑與胃腸道內吸附作用，體液及消化道 pH 可能增高。
3. 並服大量牛奶可能產生牛乳—鹼性—症候群。
4. 並用維他命 D 可能產生高鈣血症。

[包裝及貯存]

12 - 1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝



世達藥品工業股份有限公司  
台中市工業區十五路二號