

“信東” **舒壓** 膜衣錠100公絲 (阿廷諾)  
**Stermin F.C. Tablets 100mg (Atenolol)**

**【臨床藥理】**

Atenolol是一種乙型腎接受體阻斷劑 ( $\beta_1$ -Adrenergic Receptor Blocker Agent)，具有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，可降低心率及收縮力，對減除心絞痛病人之症狀有效，對高血壓的治療亦有效。口服單一劑量其藥效可達二十四小時之久；由於劑量範圍狹窄且作用迅速，很快便可看出藥物在病人身上效果，且服藥方法簡單，易被病人接受。

**【成分】**

主成分：每膜衣錠中含Atenolol 100mg

賦形劑：Microcrystalline Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Hydroxypropyl Cellulose、Magnesium Stearate、Polyethylene Glycol 6000、Hydroxypropyl Methylcellulose、Titanium Dioxide。

**【適應症】**

高血壓、狹心症。

**【用法與用量】**

本藥須由醫師處方使用。

1.成人：  
(A)高血壓：起始劑量50mg可單獨每日服用1次，或與利尿劑及其它抗高血壓治療劑同時使用，若效果不明顯則提高到一天100mg，一般服用1-2星期就會有完全之療效。

(B)狹心症：起始劑量50mg每日1次，若一星期内效果不明顯則提高劑量到一天100mg，有些病人須提高到200mg才能達到適當效果。

2.兒童：本藥物尚無用於兒童之經驗，故不宜使用。

3.老人：劑量也許要減低，特別是腎功能不全的病人。

**【注意事項】**

**〔禁忌〕**

- 1.患有二度或三度心臟傳導阻斷的病人不可服用本劑。
- 2.不可與Verapamil同時服用，若須服用Verapamil，則須事先停止使用本劑。

**〔注意事項〕**

- 1.未經治療的心臟衰竭患者，禁服本藥，若經過治療的心臟衰竭患者，可推介本藥物，但服用後若有鬱血性心臟衰竭的情況發生時，則應暫停使用。

- 2.本藥物藥理作用之一是降低心跳率，可能出現心跳緩慢現象，若發生此時可減少藥量。
- 3.本藥物是有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，所以患有慢性呼吸道阻礙的病人需小心使用，因它也可能引起氣喘病人的呼吸道阻礙。
- 4.患有心缺血病人，治療不可突然中斷，如果本藥物與Clonidine同時服用時，Clonidine不宜中斷服用，須直至本藥物停止服用後數天才可停止。
- 5.用於麻醉手術前，宜停用本藥物且間隔須四十八小時以上，如治療要繼續使用，麻醉劑如乙醚，Cyclopropane及Trichloroethylene宜特別注意，若發生Vagal dominance，可以用1-2mg (I.V.) Atropine解除。
- 6.本藥物是經由腎臟排泄，所以對嚴重腎臟機能失常的病人應依情況調整劑量。一般而言病人其Creatinine Clearance若為15-35ml/min/1.73m<sup>2</sup>則服用劑量應為每日50mg；若小於15ml/min/1.73m<sup>2</sup>則服用劑量應每隔一天服用50mg。
- 7.孕婦：像其它藥物，除非必要，否則最好不要服用。

FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數) : D

### 〔過量處理〕

過度心跳緩慢可用Atropine 1-2mg靜脈緩慢注射，若需要時，可加上乙型接受器興奮劑，如Isoprenaline 25 μg 或Orciprenaline 0.5mg靜脈緩慢注射但必須防止血壓下降太低。

### 【副作用】

一般的副作用是由於本身藥理作用所引起的，但極少發生。  
包括四肢冰冷、肌肉疲勞和心跳緩慢，至於其他乙型接受體阻斷劑常見的睡眠不寧，本藥物無此報告，很少有皮膚疹及乾眼之報告，若副作用無法加以解除則需考慮停止用藥，而停止使用是要漸進為之。

### 【保存條件】

室溫遮光儲存。

### 【包裝】

2~1000錠，瓶裝、鋁箔盒裝。  
衛署藥製字第034359號G-2529



信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路 22 號

54190990 ⑥