【適 應 症】：
緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。

【注意事項】：
請詳閱說明書後使用。

GMP G-2852
衛署藥製字第 034978 號

"達德士"
敵克炎栓劑 12.5 毫克
Diclophen Suppository 12.5mg
(Diclofenac) "DTS"

100's

【用法用量】：
本藥須由醫師處方使用。
成人：建議起始劑量為每日100~150mg。症狀較輕或長期治療時，每日投予75~100mg即足夠。
每日總劑量應分2～3次使用。為避免夜間疼痛及早晨僵硬症狀，日間以錠劑治療外，可於睡前補充一粒栓劑（至每日最大劑量150mg）。
兒童：一歲以上的孩童視病情的嚴重度給予每天0.5～2mg/kg體重，分2～3次使用。幼年型風濕性關節炎的治療可提高至3mg/kg體重分次使用。
栓劑50mg及75mg不建議使用於孩童。

Lot No.: 318112
Exp. Date: 20161208

【成份】：每一栓劑含有：
Diclofenac Sodium……12.5mg

委託商：達德士藥品有限公司
臺北市北投區承德路七段348號9樓

製造廠：衛達化學製藥股份有限公司
臺中市工業區23路21號

LB-DH12.5