

優利朗 錠 50 毫克

Benmarone Tablets 50 mg

本藥須由醫師處方使用

本藥能阻止尿酸由尿細管再吸收的作用，以降低血中尿酸值，促使尿酸由尿中排泄出來，因此對痛風和高尿酸血症是一種改善藥。

【成分】 Each Tablet Contains:

Benzbromarone.....50mg

【賦型劑】

Lactose、Microcrystalline cellulose(Avicel 101)、Pregelatinized starch(Pregel)、Primojel、Magnesium stearate

【藥理作用】

痛風病患投與本藥後，其血清尿酸的值下降，尿酸清除率提高，而肌氨酸酐清除率則沒有改變。

【特點】

1. 阻止尿酸鹽的再吸收，並加速其排泄作用。
2. 影響 Purine 的合成，抑制尿酸的形成。
3. 增加胃腸道對尿酸的排泄作用。

【適應症】 痛風、高尿酸血症。

【用法用量】

- 痛風：一日一次 25~50mg。其維持劑量一次 50mg，一日一至三次（適量增減）。
- 高尿酸血症之高血壓：一日 50mg，一日一至三次（適量增減）。

【注意事項】

● 禁忌：

1. 對本藥過敏者。
2. 嚴重肝功能不良。
3. 嚴重腎功能不良。
4. 尿酸性腎臟結石。
5. 懷孕及可能懷孕的婦女。

● 一般注意事項：

1. 在使用本藥前須檢查肝功能，以確認有無肝臟疾病。並應告知病人使用本藥可能有肝臟疾病的副作用，如出現食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜變黃等症狀，應停藥並立即就醫。
2. 急性痛風發作，在抑制前勿開始投藥。
3. 血中尿酸降低作用明顯，故投藥初期可能誘發痛風發作。
4. 尿呈酸性時，患者可能引起尿酸結石導致血尿、腎疝痛等症狀，故應多攝食水分使尿量增加，並注意病患之酸鹼平衡。
5. 長期投藥，須做肝機能檢查。
6. 腎功能異常之患者，建議酌予減量。
7. 重度肝功能異常之患者應小心使用。
8. 開始投與本藥品前應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。

● 副作用：

1. 過敏症：蕁麻疹、發疹、臉部發紅、紅斑、搔癢感。
2. 肝臟：S-GOT、S-GPT、Alkali Phosphatase 上昇。
3. 消化器：偶有胃痛、腹痛、胃部不快感、噁心、下痢軟便等現象出現。
4. 孕婦：有催畸形作之報告，故不宜使用。
5. 其他：偶有浮腫、心窩部不快感、頭痛等現象出現。

【警語】

1. 猛爆性肝炎等嚴重肝臟不良反應主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。
2. 在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。

【貯存】 請存放在 25°C 以下遮光保存，並放置在孩童無法取得處。

【包裝】 2~1000 錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

委託者：意欣國際有限公司

地 址：高雄市三民區懷安街 119 號

電 話：07-3863323，3867252

製造廠：皇佳化學製藥股份有限公司

地 址：833 高雄市鳥松區松埔路 1 巷 1 號