

內外 抑膀錠

5公絲(奧斯必得寧)
Oxypan Tablets 5mg "N.W.
(Oxybutynin)

首選藥物

81.5.30

本藥為合成的抗膽鹼激素，直接作用於膀胱之平滑肌上，使其不產生Muscarinic action，因此，可以增加每次排尿時的尿量，減少排尿的次數。並可避免不必要的膀胱收縮，減輕尿急的痛苦。

【成分】每錠含：

Oxybutynin chloride.....5mg

【適應症】

因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症之緩解。

【用法・用量】本藥須由醫師處方使用

成人：一次5mg，一日2~3次。（每日最高劑量一次5mg，一日四次）

孩童：一次5mg，一日2次。（每日最高劑量一次5mg，一日三次）

【藥理作用】

1.膀胱運動抑制作用

2.排尿調節作用


3.直接作用於膀胱平滑肌並抑制其收縮作用

【臨床效果】

1.神經因性膀胱及不安定膀胱患者，經口服後，初發尿意量增加，而無抑制收縮波會消失或減少。

2.一般臨床試驗的有效率：神經因性膀胱56.7%，不安定膀胱57.1%。

3.比較臨床試驗：以神經因性膀胱及不安定膀胱患者做二重盲檢試驗，確定其為有效。



【注意事項】

一、禁忌：

1.確定為下部尿路閉塞症所引起的排尿困難、尿閉等症之患者。

2.綠內障、重症之心疾患及有麻痺性腸塞之病患。

3.高齡病患以及有腸弛緩或重症肌無力症之衰弱病患。

二、慎重投藥：

1.有排尿困難之前立腺肥大病患。

2.甲狀腺機能亢進症、鬱血性心不全、不整脈、潰瘍性大腸炎，在高溫環境下之病患以及有嚴重肝或腎疾病之病患。

三、副作用：

1.精神神經系：偶有眩暈、頭痛、指尖麻痺、傾眠等現象出現。

2.消化器系：口渴、偶有下痢、胃腸障礙、胃部不適、嘔氣、食慾不振。

3.過敏症：偶而會有發疹等過敏症狀出現。

4.泌尿器系：偶有排尿困難、尿閉、殘尿等現象。

5.肝臟：偶而出現GOT、GPT上升。

6.血液：偶有血小板減少現象。

7.其他：曾有浮腫、倦怠感、口中苦味、發熱、霧視、眼結膜充血、汗流不出來、咽頭部痛、手乾燥感、噁聲等症狀出現。

四、高齡者之投藥：

對高齡者之投藥，先以少量投藥並注意觀察，必須注意切勿過量投藥。

五、孕婦、授乳婦之投藥：

妊娠中投藥之安全性尚未確定，因此孕婦及可能懷孕之婦女，勿使用本藥，由動物實驗報告，本藥會移行到乳汁中，故授乳婦亦勿使用本藥。

六、小兒之投藥：對小兒之安全性尚未確定。

七、相互作用：

下列藥品會增強本藥之作用：三環系抗憂鬱劑、phenothiazines系藥劑、monoamine氧化酵素阻害劑等。

八、其他：

視調節障礙、傾眠等，故服用本藥後，勿駕車或操作危險性機器。

【包裝】4~1000錠瓶裝及盒裝



內外化學工業股份有限公司