“羅得” 滅咳 糖漿
Meicough Syrup “R00T”

GMP G-2914
衛署藥製字第 035139 號

「作用」:

1. 本藥所含 Codeine Phosphate 能直接作用於延髓之咳嗽中樞抑制咳嗽反射，且具呼吸道粘膜乾燥作用，Codeine 經由胃腸道吸收良好，口服後 1 小時可達血中最高濃度，作用期可持續 4 小時。
2. Pseudoephedrine HCl 能直接作用於呼吸道粘膜上的α一腎上腺性受體使血管收縮，因此可使鼻粘膜之腫脹消退，恢復呼吸道之暢通，並可作用於β2-腎上腺受體，使支氣管平滑肌弛張，口服後 30 分鐘即可使鼻粘膜收縮，且藥效持續 4 至 6 小時。
3. Guaifenesin 能增加呼吸道液體降低痰液的粘稠度，並促進痰液的排除。

「成分」:每 ml 含：

Codeine Phosphate	2 mg
Pseudoephedrine Hydrochloride	6 mg
Guaifenesin	20 mg

「適應症」:

鎮咳、祛痰(伴隨上呼吸道充血和支氣管充血的感冒，枯草熱、鼻竇炎、咳嗽、鼻塞、打噴嚏、流鼻水、喀痰之緩解)。

「用法用量」:

成人(含 12 歲)1 天 3 次，每次 3ml，6-11 歲 1 天 3 次，每次 1.5ml，2-5 歲 1 天 2 次，每次 1ml。
本品用於兒童，僅限臨床效益大於風險時使用。
本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」:

1.禁忌：

(1)對主成分過敏者。

(2)兒童扁桃腺及腺樣體切除術後止痛、已知 CYP2D6 快速藥物代謝者(ultra-rapidmetabolisers)及哺乳婦女

2.慎重投與：心血管疾患、糖尿病患者、高血壓患者、甲狀腺功能異淌者、愛迪生氏症、慢性潰瘍性腸炎患者、曾有藥物濫用或依藥性者、肝腎功能不健全者。

3.副作用：

(1)精神、神經系統：偶有神經過敏、倦怠、不眠、思睡、排尿困難、頭痛等現象。

(2)循環系統：偶有心跳速率改變。

(3)消化系統：偶有嗯心、嘔吐、便秘等現象。

4.懷孕婦女：動物安全性試驗尚未建立，本品僅於確切須要時方可投與懷孕婦女。

5.授乳婦女：Codeine 及 Pseudoephedrine 兩成分可由乳腺分泌乳汁中，因此授乳婦女投與時須十分注意。

6.藥物相互作用：

(1)與β-腎上腺性阻斷劑併用可能增加 Pseudoephedrine 的抑制作用。

(2)與強心配糖體併用可能增加心律不整。

(3)與降壓劑併用可能減低降壓作用。

(4)與 MAO 抑制劑可能增強 Pseudoephedrine 的抑制作用，並可能造成血壓上升。

7.其它：避免長期服用，2 歲以下兒童不用為宜。

[警語]:

1. 長期使用會導致成癮。

2. 早產兒、1 歲以下嬰兒及 1～2 歲幼兒，不建議使用。

3. 2～12 歲兒童，依年齡減量使用。

4. 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

「包裝」:60-4000ml 瓶、罐裝。

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段 65 號