

“新喜”
沙莫慕莉 膠囊
Saboli capsules “N.C.P.”

本藥須由醫師處方使用

【成分】

每膠囊含：

有效成分及含量：Methyltestosterone.....10mg

Thiamine Propyl Disulfide.....5mg

賦形劑：Starch

膠囊殼成分：

Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Titanium Dioxide、
Tartrazine、Sunset Yellow FCF、Purified Water

【用途(適應症)】

經臨床徵象及實驗室檢驗確認因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症(hypogonadism)的替代治療、抑制乳汁分泌。

【用法用量】

成人一天服一至三粒。

【警語與注意事項】

1. 上市後研究發現睪固酮補充治療可能會增加嚴重心血管事件之風險，如心肌梗塞、中風或心臟衰竭，或增加靜脈栓塞事件之風險，如深層靜脈血栓形成和肺栓塞，故開立處方前後應謹慎評估患者是否具有任何心血管相關之風險因子或病史。
2. 由於長期安全性數據資料不足，當接受睪固酮補充治療期間，應同時密切監測可能發生的嚴重心血管事件。
3. 禁忌：
 - (a) 有 Androgen 依存腫瘤(例如攝護腺癌)及有嫌疑之患者。
 - (b) 有肝障礙患者。
4. 慎重投與：
 - (a) 攝護腺肥大患者。
 - (b) 心疾患、腎疾患、有癌之骨轉移患者，高血鈣症及高齡者。
5. 對妊婦之投與：會引起女性胎兒男性化、妊婦或有妊娠可能之婦人勿投與。
6. 幼小兒之投與：會使骨端之早期閉鎖，性的早熟，應慎重投與。
7. 副作用：
 - (a) 若有下面各症狀出現者減量或中止以適當方法處置之。
 - (1) 肝臟：肝機能檢查值之異常，黃疸。
 - (2) 女性：難恢復之嘶啞、多毛、痤瘡、色素沉著、月經異常、陰核肥大、性慾亢進。
 - (3) 男性：陰莖肥大、持續性勃起、特別因大量繼續投與等而致睪丸萎縮、精子減少、精液減少等之睪丸機能抑制。
 - (b) 過敏症：過敏症狀出現時，應停止用藥。
 - (c) 消化器官：有時會噁心、嘔吐、食慾不振等出現。
 - (d) 精神症狀：偶有精神狀態變化。
 - (e) 皮膚：皮膚色調變化(紅斑等)出現。
8. 其他：類似化合物(蛋白同化)(男性荷爾蒙劑)之長期大量投與而致再生不良性貧血等觀察中發現有肝腫瘤之患者。

【包裝】

2~1000 顆盒裝、瓶裝。

【儲存條件】：

室溫(15~25°C)儲存。



新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號