

“新喜”
喜胃定錠 300 毫克(希每得定)
 Cimetin Tablets 300mg“N.C.P.” (Cimetidine)

本藥須由醫師處方使用

【成分】 Each tablet contains :

主成分：Cimetidine.....300mg

賦形劑：Prejel、Sodium Starch Glycolate、Lactose、Talc、Magnesium Stearate、
 Poloxamer 407

【作用】

1. 直接阻斷 Histamine 在胃中壁細胞上之 H₂-接受體的作用，藥理實驗證實本品對組織胺、胃泌素、迷走神經、胰島素食物、咖啡鹼所引起的胃酸分泌均能有效的控制。
2. 本品可 24 小時持續性抑制胃酸分泌。
3. 本品較迷走神經切除術更能有效的控制胃酸分泌。
4. 可促進胃黏膜的完整性，增加抵抗力。
5. 除在治療胃、十二指腸潰瘍外，臨床上亦證實本品對急性靡爛性胃炎所致的上胃腸道出血，甚具療效。

【用途(適應症)】：

十二指腸潰瘍、良性胃潰瘍、逆流性食道炎，上腸胃道出血、胃泌素瘤綜合症候群。

【注意事項】：

- 1、對本品有過敏者禁用。
- 2、本品能通過胎盤並能經由母乳排泄，因此懷孕婦女及授乳婦女勿用為宜。
- 3、偶有暫時的腹瀉、疲倦、眩暈及皮膚疹現象。
- 4、少數男性患者，有輕微的女性型乳房現象，但繼續服藥此症狀可能不變或恢復正常。
- 5、極少數腎機能不良或腦綜合病症的老年人或重症患者，偶有輕微的精神混亂現象，但停藥後可消失。
- 6、少有血中氯鈣交換及血中沉酸內鹽增加之病例。

【用法用量】

1. 十二指腸潰瘍及 良性胃潰瘍：	1 天 5 錠(早午晚三餐各 1 錠，睡前 2 錠)，連服 4-6 週。
2. 逆流性食道炎：	1 天 4 次，1 次 2 錠(開始治療時，可併用制酸劑，至症狀消除後，繼續單獨以本品治療，癒後可續以維持量治療。防止復發維持量：每天睡前服 2 錠，或早晚各服 1-2 錠。
3. 上胃腸道出血：	口服投予，劑量每天 5 錠，必要時可由注射給藥。
4. Zollinger-Ellison 症候群：	每天三餐時各 1-2 錠，睡前 2 錠，即可有效地控制症狀。

【包裝】：8-1000 錠瓶裝。

【儲存條件】 25°C 以下儲存。



委託者：
 新喜國際企業股份有限公司
 台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號

製造廠：
 壽元化學工業(股)公司
 嘉義市西區湖內里新民路 128 號