衛署藥製字第 035164 號

“新喜”長趨敏錠 50 毫克(布克利啶)

Longlmin Tablets 50mg”N.C.P.”(Buclizine)

本藥須由醫師處方使用

【成分】Each Tablet contains：

有效成分及含量：Buclizine bihydrochloride…….50mg

賦形劑：Carboxymethylcellulose sodium、Starch、 Lactose、Magnesium Stearate、Food Color Yellow No.5、Food Color Blue No.1

【用途(適應症)】

過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、蕁麻疹、過敏性氣喘、食物或藥物過敏、美尼攸氏症、眩暈、噁心、嘔吐及暈船、車、飛機之預防。

【注意事項】

1. 需置於小孩接觸不到之處。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3. 除非醫師處方，授乳婦不建議自行使用。

4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【副作用】

思睡、倦怠感、口乾、偶有視覺上之困擾。偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。

【用法用量】

通常成人每次 1 錠，視病情需要可增至每日 2 ~ 3 錠，於晚上服用更方便，或為防止暈車、船、飛機時於出發前 30 分鐘至 1 小時服用，依年齡症狀適宜增減之。

【警語】

1. 除非有醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

2. 老年人應小心使用本劑，2 歲以下不建議服用。

3. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺種大引起之排尿困難患者，請勿服用此藥。

4. 服用此藥不得與酒精性飲料合用。

5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。

6. 服用本藥後，勿駕車或操作危險器械。

7. 孕婦禁用。

【包裝】

1000 粒以下塑膠瓶裝

【儲存條件】:

室溫(15~25℃)儲存。

新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號