

解熱・鎮痛劑 五分珠錠 Wufenchn Tablets

[成份] 每錠含

Acetaminophen.....	116.7mg
Ethenzamide.....	166.7mg
Bromvalerylurea	100mg
Caffeine Anhydrous.....	25mg

[適應症]

退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。

[用法、用量]

通常成人一次2錠，7~14歲一次1錠，一日服用3次，每次間隔四小時以上，並避免空腹時使用。本劑須由醫師、藥師、兼創生指示藥品。

[注意事項]

- 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 證至陳光復前，宜保存於陰涼處。
- 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 不得併服含酒精飲料。

[警語]

- 服後後，若有發癢、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀，應停藥並就醫。
- 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - 12歲以下者：建議自行使用。
 2. 曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 服用本類製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。
- 成人不得連續服用本類製劑超過7天，小孩不得超過3天，若情況需要，繼續服用本類製劑前，請洽醫師。
- 酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為Acetaminophen及Ethenzamide可能造成肝損害及胃出血。
- 肝毒性：
 1. 使用Acetaminophen (paracetamol) 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植或死亡。大部份發生肝臟問題之病例原因使用超過每日4,000毫克的Acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含有Acetaminophen之藥品。
 2. 過敏反應：Acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是不知道的情況下同時使用了其他同樣含有Acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
 3. 有著在肝臟疾病的病人，以及於使用Acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應謹防病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有Acetaminophen或Paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有Acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的Acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
- 過量：
 1. 服用過量，Acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、嘔吐、蛋白及出汗。
 2. 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許時，建議諮詢過敏反應。
 3. Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生急性腎臟衰竭，並建議發送以反映血尿常之不良反應。用藥過量之肝毒性症狀可能包括：噁心、嘔吐、出汗和全身不適。肝臟的顯示及實驗室證據可能要到攝入後48~72小時才明顯可見。
- 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用Acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。請參照下列情況服用。
 1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 本藥不得使用於12歲以下兒童，亦不得使用於成人之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病—葛氏症候群 (Reye's Syndrome) 有相關性。
 - (2) 曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。
 - (3) 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏症 (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency) 患者，不得服用本藥。
- 十一、本藥含Ethenzamide，應諮詢下列事項：
 1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 本藥不得使用於12歲以下兒童，亦不得使用於成人之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病—葛氏症候群 (Reye's Syndrome) 有相關性。
 - (2) 曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。
 - (3) 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏症 (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency) 患者，不得服用本藥。

[賦形劑] Potato Starch、Magnesium Aluminum Metasilicate、Hydroxypropyl Cellulose、Carboxymethylcellulose Calcium、Talc、Magnesium Stearate

[儲藏] 賯存於30°C以下乾燥處。

[包裝] 6~1000錠，真空成型硬膠盒裝。

衛署藥製字第035175號

藥商：易生堂製藥廠股份有限公司

地址：台北市武昌街一段26·28號

製造廠：易生堂製藥廠股份有限公司新竹廠

地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區四維路30號