

“新喜”

邁胃錠 400 毫克(美鋁莖)

MAGAN TABLETS 400MG “N.C.P.”(MAGALDRATE)

醫師藥師藥劑生指示藥品

本品為氫氧化鋁與氫氧化鎂成化學性的結合物，而非物理性的混合，具有制酸作用，不引起鹼中毒二次性酸分泌現象。

【成分】每錠含：

有效成分及含量：Magaldrate.....400mg

賦形劑：Microcrystalline cellulose、Mannitol、Magnesium Stearate、Menthol、PEG 6000、Potato Starch、Saccharine sodium、 γ -Starch

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保存。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

【用法用量】

一天 4 次，飯前及就寢前或需要時服用，應嚼碎後吞服。
成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量。

【警語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5g。
 - (2) 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
 - (3) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (4) 本藥品不得併用其他藥品。
2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
3. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
4. 本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
5. 本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

【儲存條件】

避免陽光直射，宜保存於陰涼之處，儲存溫度 15~25°C。

【包裝】

1000 粒以下塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝



新喜國際企業股份有限公司
台南市鹽水區孫厝里孫厝寮 4-6 號