

“安星” 那普寧錠 500毫克 (那普洛仙) Naproxen Tablets 500mg "Astar"

【成 分】 Each tablet contains :

Naproxen 500mg

【賦形劑】

Corn Starch、Lactose、Sodium Starch Glycolate、Povidone、Tartrazine、Food color Red No.6、Magnesium Stearate。

【作 用】

Naproxen口服後迅速由胃腸道吸收，2-4小時後即有最高濃度，且維持長時間有效濃度，能夠阻斷前列腺素的合成與釋出，抑制子宮的前列腺素，減少子宮肌肉收縮，可緩解由於月經困難、拔牙、女陰切開術和運動傷害引起的輕度至中度疼痛，並緩解風濕性關節炎和骨關節炎的症狀，本品與Corticosteroid併用時可減少Corticosteroid之用量。

【適應症】

風濕性關節炎、骨關節炎、僵直性脊椎炎、腱炎、黏液囊炎、急性痛風、手術外傷後的消炎、鎮痛、原發性經痛。

【用 法、用 量】

- 1.通常成人每次250-500mg，每日二次。
- 2.急性痛風，立即服用750mg，之後每8小時250mg。
- 3.本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.對本品曾有過敏性者及因使用Aspirin或其他非類固醇類消炎劑引起氣喘、鼻炎或蕁麻疹者，以及有嚴重消化性潰瘍者不宜使用。
- 2.孕婦及授乳婦之安全資料尚未建立，不宜使用。
- 3.與具有高度血漿蛋白結合性的製劑（如Hydantoin，Sulfonylurea，磺胺劑或抗凝血劑）併用時，必須小心，以防過量中毒。
- 4.若與Corticosteroid併用時，宜減少Corticosteroid之用量，但應慢慢減量。
- 5.會影響17-Ketogenic Steroid的測定值，在檢查48小時前暫停使用。
- 6.若遇服用本劑過量時，宜迅速於短時間內投予活性碳，以減少其吸收量，急性中毒時可使用Phenobarbital解毒。

【包 裝】 4~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

【貯 存】 請將本品於25°C以下避光貯存。