



“瑞士”

易寧神 注射液 50 毫克/毫升 (哈伯度)
BINISON injection 50mg/ml " SWISS " (Haloperidol)

“易寧神”注射液為一長效型精神安定劑，與口服及其他抗精神病用藥比較，不僅具有較長的作用期，能減少用藥頻率，並具有較低的錐體外副作用及得到較佳的吸收，對於急躁、激動、妄想、緊張、抑鬱等精神症狀，皆能有效控制，為一高優異性的抗精神病用藥。

【成 分】Each ml contains:

Haloperidol (as decanoate) 50mg

賦 形 劑: Benzyl Alcohol、Vitamin E Acetate 100%、Sesame Oil

【藥理作用】1. Haloperidol decanoate 為長效型精神安定劑，其作用機轉為阻斷 dopamine 作用，並增加其代謝轉換速率。

2. 本品注射後，緩慢、持續地釋放出 Haloperidol，注射後的第六天達到血中最高濃度，半生期約三週，經過 3~4 次給藥後可得穩定血中濃度。

【適 應 症】精神病狀態，躁病，噁心，嘔吐，攻擊性與破壞性之行為障礙，舞蹈病。

【用法用量】深層肌肉注射，成人初劑量為每四星期一次，一次 1c.c.，初期最高一次劑量為 2c.c.，劑量依症狀酌予增減，每次劑量不宜超過 6c.c.，老年人初劑量每月一次，一次 0.5~1c.c.。本品限由醫師使用。

【注意事項】一、副作用：治療初期偶有 1. 可逆性錐體外反應。

2. 間有暈眩，嗜睡，焦慮，精神激越等。

3. 高熱，神經惡化症。

4. 心悸，血壓變動。

二、下列病患謹慎使用：1. 嚴重心血管疾病者。

2. 使用抗癲癇藥或有癲癇病史及有 EEG 不正常病史者。

3. 過敏或過敏病史者。

4. 使用抗凝血劑者。

5. 甲狀腺毒症者。

三、若須同時使用抗巴金森劑，須在本藥停用後，方可使用。

四、本品不宜與鋰鹽及其他抗精神病用藥合併使用。

五、駕車及操作精密儀器患者，宜謹慎使用。

六、孕婦唯有在治療利益大於危險性時方可使用。

【警 語】曾有精神病患以 haloperidol 治療而發生猝死、QT 波延長

(QT-prolongation) 和 torsades de pointes 之案例報告，尤其是比仿單建議更高的治療劑量和靜脈注射有較高的風險導致 QT 波延長和 torsades de pointes 發生。發生 QT 波延長、torsades de pointes 之高風險案例可能發生於無潛在危險因子之病患，但具有以下危險因子之病患必須特別注意，包括建議接受治療之前已有 QT 波延長情形之患者(包括電解質不平衡【特別是低血鉀和低血鎂】、使用已知會引起 QT 波延長之藥物、心血管疾病、甲狀腺功能低下、QT 波延長之家族病史)。倘若 haloperidol 以靜脈注射途徑給藥，應監測病患之心電圖，追蹤其 QT 波及心律不整之情形。

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗 (Randomized controlled trial, RCT) 臨床試驗及回溯性世代研究 (Retrospective cohort study) 發現，抗精神病藥品，包括傳統 (Conventional) 與非典型 (Atypical) 之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患 (dementia-related psychosis) 的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【儲存條件】請儲存於 25°C 以下。

【包 裝】1,3ml/Amp, 100Amp 以下盒裝