衛署藥製字
第035697號
G-3175

“華興” 治黴寧乳膏 20毫克/公克

（克多可那挫）

Zumelin Cream 20mg/Gm “H.S.”
(Ketoconazole)

成　　分：Each Gm Cream Contains :
Ketoconazole····· 20mg

賦 形 劑：Stearyl Alcohol、Isopropyl Myristate、Cetyl Alcohol、White Soft Paraffin、Polyoxyl 40 Stearate、Polysorbate 80、Glyceryl Monostearate、Propylene Glycol、Methyl Paraben、Propylparaben、Cochineal RED A、Butylated Hydroxytoluene、Fragrance-O-Flower 801-137、Purified Water

作用特性：(1)治黴寧乳膏為含有Ketoconazole之乳膏製劑，對於皮膚局部作用良好，對抗皮癬菌屬(毛髮癬菌、表皮癬菌屬、小芽胞癬菌屬)及酵母菌等之皮膚黴菌感染具有顯著之治療效果。

(2)治黴寧乳膏為新一代之imidazole類抗黴菌劑，能有效阻止黴菌之Ergosterol合成。

(3)治黴寧乳膏，對皮膚無穿透效果，無法由皮膚吸收而測出血中濃度。

適 應 症：皮膚黴菌和酵母菌所引起的皮膚、頭髮及指甲感染症。

用法用量：一般黴菌感染如軀幹癬、股癬、手癬、足癬(香港腳)及皮膚的念珠菌感染有效。

使用時，將藥膏塗在發病的皮膚上，並以手指輕輕地推開，早晚各一次。但對於汗斑的治療一天一次即可，不可中斷使用，直至症狀消失後數日為止。如使用四個星期後，症狀沒改善的話，須請教醫生。治療期間，汗斑為２～３星期，酵母菌感染２～３星期，股癬２～４星期，軀幹癬３～４星期，足癬４～６星期。平常應注意衛生保健，以防感染再感染。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項:（１）不可用於眼睛。
（２）對於脂漏性皮膚炎不可在患者長期塗用類固醇製劑後馬上使用治黴寧乳膏。
（３）因局部使用，不會被吸收，故無致癌及畸胎的報告。

儲　　存：儲存於25℃以下。

包　　裝：100gm以下金屬軟管裝，100gm以下罐裝。

委託者：
華興化學製藥廠股份有限公司
彰化縣田尾鄉饒平村四維巷128號
製造廠：
瑞士藥廠股份有限公司新市廠
台南市新市區中山路182號