補酵素型維他命 B_{12}

"信隆" 美可 0.5 毫克膠囊 (甲鈷胺明)

Meco 0.5mg Capsules "S.L"

(Mecobalamin)

【 成　　分 】每膠囊含有：

Mecobalamin……..0.5mg

【 作　　用 】本品是存在體內的補酵素型維他命 B_{12} 的一種，在由 Homo-cyteine 合成 Methionine 過程中的甲基轉移反應中擔任重要的角色。又在 Methionine 合成過程中能促進貯藏型葉酸的利用，同時直接參與 t-RNA 的甲基化等核酸代謝。由動物實驗證實本品有促進神經細胞內核酸合成，促進神經纖維之髓鞘形成的作用。本品用於治療末稍性神經障礙。

【 適　應　症 】末稍性神經障礙。

【用　法　用　量】成人一日三粒，分三次服用。

【 注　意　事　項 】

1.副作用：過敏症，如有發疹等過敏症狀出現時應停止服用。

2.消化器官，偶有胃部不適感，食慾不振，噁心、下痢，罕有腹疼等症狀出現。

3.接觸水銀及其化合物的從業人員，避免長期大量服用本藥。

【賦形劑清單】Lactose、Magnesium Stearate、Talc、Starch Anhydrous、Light Anhydrous Silicic Acid

【 膠　囊　殼 】Brilliant Blue FCF、Gelatin、New Coccin、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Titanium Dioxide

【 包　　裝 】6~1000 粒鋁箔盒裝及塑膠瓶裝。

本藥須由醫師處方使用。

衛署藥製字第 035997　G-3312 號

信隆 SHINLON SPC 藥品

信隆藥品工業股份有限公司

Shinlon Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.

台灣・台南市仁德區中正路三段 269 號

補酵素型維他命 B_{12}

"信隆" 美可 0.5 毫克膠囊 (甲鈷胺明)

Meco 0.5mg Capsules "S.L"

(Mecobalamin)

【 成　　分 】每膠囊含有：

Mecobalamin……..0.5mg

【 作　　用 】本品是存在體內的補酵素型維他命 B_{12} 的一種，在由 Homo-cyteine 合成 Methionine 過程中的甲基轉移反應中擔任重要的角色。又在 Methionine 合成過程中能促進貯藏型葉酸的利用，同時直接參與 t-RNA 的甲基化等核酸代謝。由動物實驗證實本品有促進神經細胞內核酸合成，促進神經纖維之髓鞘形成的作用。本品用於治療末稍性神經障礙。

【 適　應　症 】末稍性神經障礙。

【用　法　用　量】成人一日三粒，分三次服用。

【 注　意　事　項 】**1.副作用：過敏症，如有發疹等過敏症狀出現時應停止服用。**

2.消化器官，偶有胃部不適感，食慾不振，噁心、下痢，罕有腹疼等症狀出現。

3.接觸水銀及其化合物的從業人員，避免長期大量服用本藥。

【賦形劑清單】Lactose、Magnesium Stearate、Talc、Starch Anhydrous、Light Anhydrous Silicic Acid

【 包　　裝 】6~1000 粒鋁箔盒裝及塑膠瓶裝。

本藥須由醫師處方使用。

衛署藥製字第 035997　G-3312 號

信隆 "SHINLON" SPC 藥品

信 隆 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司

Shinlon Pharmaceutical Ind, Co., Ltd.

台灣・台南市仁德區中正路三段 269 號