

"安星"安普錠400毫克(伊普)

Ibuprofen Tablets 400 mg "Astar"

【成 分】 每錠含

Ibuprofen.....400 mg

【賦形劑】

Avicel、Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate。

【作 用】

- 1.抑制前列腺素(Prostaglandin)之合成，為非類固醇、非比林系之消炎鎮痛解熱劑。
- 2.口服吸收快，藥效迅速。
- 3.治療輕度至中度疼痛，如經痛、偏頭痛、手術後疼痛及風濕性疾病，藥效與Indomethacin相若，但副作用較少。

【適應症】

風濕性關節炎、骨關節炎、緩解肌肉骨骼發炎引起之疼痛。

【用法用量】

- 1.成人一次1錠(400mg)，一日3-4次。
- 2.兒童一天20mg/kg體重，分次服用，30公斤以下兒童，一天最大量為500mg。
- 3.本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

(一)一般注意事項：

- 1.使用消炎鎮痛劑治療乃為對症療法，而非原因療法。
- 2.用於治療慢性疾患（慢性風濕性關節炎）時應考慮下列事項：
 - (1)長期投與時，須定期作臨床檢查（尿液檢查、血液檢查及肝機能檢查），如發現有異常現象，則需採取減量或停藥等適當措施。
 - (2)考慮採用非藥物性療法。
- 3.用於治療急性格疾患時，應考慮下列事項：
 - (1)對於急性炎症，需考慮其病痛及發熱程度而給藥。
 - (2)原則上應避免長期使用同一類藥品。
 - (3)如有原因療法，則應採用。
- 4.須仔細觀察患者之狀況，留意有否副作用發生。可能出現過度體溫下降、虛脫、四肢冷卻等症狀，對患有高燒之幼兒及高齡或消耗性疾患之患者，給藥後尤須注意觀察患者之狀況。
- 5.本藥可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投與。
- 6.儘量避免與其他消炎鎮痛劑合併使用。
- 7.對小兒及高齡患者，尤須注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投與。

(二)禁忌症：

1.消化性潰瘍患者。2.重症之血液異常患者。3.重症之肝障礙患者。4.重症之腎障礙患者。5.重症之心機能不全患者。6.對本劑過敏之患者。7.患有阿司匹靈(Aspirin)氣喘或曾有該病歷之患者。

(三)對下列患者須慎重投與：

1.患有消化性潰瘍病歷之患者。2.患有血液異常或曾有此種病歷之患者。3.患有肝障礙或曾有該病歷之患者。4.心機能障礙之患者。5.曾有過敏症病歷之患者。6.支氣管氣喘之患者。

(四)副作用：

1.血液：可能會引起再生不良性貧血、顆粒球缺乏症、血小板減少等血液障礙，故須做血液檢查並小心觀察，如有異常狀況出現，必須立刻停藥。

2.過敏症：有時可能會產生Stevens-Johnson症候群（發熱、皮膚黏膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎等症候群）、Lyell症候群（中毒性表皮壞死症）、發疹或誘發氣喘等症狀，遇有此等過敏症狀出現時，必須立刻停藥。

3.感覺器官：(1)眼：可能會有視覺異常等症狀出現，若有此等症狀出現時，必須立刻停藥。

(2)耳：可能出現重聽及耳鳴等症狀。

4.肝臟：可能出現黃疸及氨基轉移酶(Transaminase)值異常等現象。

5.消化器官：可能會引起胃腸出血，遇有此等現象，必須立刻停藥。有時亦可能會有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、胃部不快感等現象，或出現口內炎，便祕等症狀。

6.精神及神經系統：有時會出現頭痛、暈眩及抑鬱等症狀。

7.心臟血管系統：有時會出現低血壓等症狀。

8.其他：可能會出現浮腫。

(五)孕婦及授乳婦人之投與：

根據動物實驗報告，本藥對動物胎兒具有毒性，對孕婦及授乳婦人之安全性尚未確立，對於孕婦或可能懷孕之婦女及授乳之婦人不要投與。

(六)酒精警語：

若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問你的醫師你是否能服用Ibuprofen或其他鎮痛解熱劑，因為Ibuprofen可能造成胃出血。

(七)室溫保存。

【包 裝】

6-1000粒瓶裝、PTP鋁箔盒裝