消除眼睛疲勞・消炎

"大豐" 舒舒眼藥水

SUSU

EYE DROPS "T.F."

本品乃針對症狀，用有效成分組合而成的處方。正確使用舒舒眼藥水可充份治療靈魂之窗眼睛的健康。

〔特點〕:

1.消除眼睛的炎症及充血：

Naphazoline HCl 爲擬交感神經興奮劑。Zinc sulfate 具有優良的消炎作用，能消除充血，並減輕眼睛之痛癢。

2.抗過敏作用。

Chlorpheniramine maleate 爲抗組織胺，可以緩解因眼睛過敏所引起的不適感。

〔成分〕: 每 ml 中含有：

Naphazoline hydrochloride.....0.03mg
Chlorpheniramine maleate.....0.1mg
Zinc sulfate.....0.5mg
Pyridoxine hydrochloride.....1mg
Calcium pantothenate.....1mg

〔適應症〕: 暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅、眼睛疲勞、眼睛癢。

〔用法用量〕: 每日點眼 3~6 次，每次 1~2 滴。**醫師藥師藥劑生指示藥品。**

〔注意事項〕:

(1)為防止兒童誤食請妥善保管。
(2)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
(3)使用前，請洗淨雙手。
(4)請依照藥品標示使用。
(5)過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶 30 天後請勿繼續使用。
(6)藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
(7)為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。
(8)使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘後點藥。
(9)使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏，並請隔開至少 10 分鐘後點藥。

〔警語〕:

(一) 以下情況應停藥立即就醫：
(A)連續使用三天（或 72 小時）症狀未解除。
(B)使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
(C)發生過敏反應。
(D)青光眼（Glaucoma）患者。
(二) 對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
(三) 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。
(四) 本藥含血管收縮劑過度使用會增加眼睛紅腫。
(五) 青光眼患者，除非經醫師指示，否則不要使用含血管收縮成份之本藥。

〔包裝〕: 100 公撮以下塑膠瓶裝。　　衛署藥製字第 036152 號(G-3398)

GMP 藥廠

大豐製藥股份有限公司
公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷 11 號

文仿單應檢附中文譯本

No. 014