舒 胃 膠 懸浮液
Simegel Suspension

瑞安大藥廠股份有限公司 PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP 衛署藥製字第 036316 號 GMP 優良藥品 G-3508 號

醫師藥師藥劑生指示藥

【成　　分】

每 mL 含：

Simethicone	4.00 mg
Dried Aluminum Hydroxide Gel (Eq. to Aluminum Hydroxide 40 mg)	52.29 mg
Magnesium Hydroxide	40.00 mg

賦形劑：Glycine, Methylparaben, Propylparaben, Saccharin Sodium, Sorbitol Solution, Peppermint Spirit, Xanthan Gum

【中和酸能力】

單次劑量(10 mL)之酸中和能力為 19.45mEq，鎂含量為 13.72mEq。

【適 應 症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【用法用量】

一天 3 次，飯後 1 小時及睡前或需要時服用。

成人每次 10 mL，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 5 mL；3 歲以上未滿 6 歲，每次 2.5 mL；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【藥理作用】

1. Simethicone 具有界面活性，能降低表面張力，而產生消泡作用，可消除腹部飽脹，改善胃腸消化不良。
2. Aluminum Hydroxide 胃中會中和過剩的胃酸。
3. Magnesium Hydroxide 為制酸劑，能產生中和胃酸效果。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況發生，應立即停藥就醫。
5. 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
6. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis Encephalopathy)及低磷血症、應謹慎小心使用。

【警語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
(1) 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5 g。
(2) 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
(3) 一天內不可月艮用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
(4) 本藥不得併用其他藥品。
2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
3. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
4. 本藥含鋁之制酸成分可能引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
5. 本藥含鎂之制酸成分可能引起腹瀉。
6. 本藥含碳酸鹽(或碳酸氫鹽)之制酸成分，可能引起腹瀉、打嗝。

【儲存條件】

請存放於室溫(15~30℃)陰涼處所。

【包裝種類】

60~4000 毫升塑膠瓶裝
6~400 包(每包 10 毫升)鋁箔袋盒裝

瑞 安 大 藥 廠 股 份 有 限 公 司
地　　址：台北市松山區光復南路 1 號 12 樓之 2
製 造 廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠
廠　　址：桃園市觀音區草漯里大同一路 26 號
服務電話：(02)2766-0887