百克痛® 療痠痛凝膠

PAIKOTUNG LIAOSUANTUNG GEL

衛署藥製字第036317號

【有效成分及含量】每GM中含有：

Etofenamate ………………………………………………………… 50mg

【其他成分(賦形劑)】：

Poloxamer 407、Carboxypolymethylene、Methyl Paraben、Sodium Metabisulfite、Butylated hydroxytoluene、Propylene Glycol、PEG 400、Edetate Disodium、Triethanolamine、dl-α-Tocopheryl Acetate、Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil、l-Menthol、Methylsalicylate、Camphor、Ethanol、Purified Water

【用途(適應症)】肌肉性風濕症、上腕肩胛關節周圍炎、腰痛坐骨神經痛、腱鞘炎、粘液囊炎。

【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用：

1.曾因本藥成分引起過敏的人。

2.曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏現象者。

二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1.有深部皮膚組織感染。

三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1.兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。 2.二歲以下。

四、其他使用上注意事項：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。 2.避免陽光直射。

3.勿超過建議使用量或使用次數。

4.使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

5.使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

6.本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。

7.請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

8.本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

9.使用後請保持使用部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

10.避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。

11.不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。

【用法用量】：每日3-4次，依疼痛範圍之大小，取適量塗敷患部並加以按摩。每次使用前，請以濕布擦去前次遺留之凝膠。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	紅斑、搔癢、刺痛感。
其他	水楊酸效應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)。

二、使用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:

(一) 若有上述外之其他不適情況產生。

(二) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】1000公克以下鋁管裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

適用藥害救濟制度

委託者
天良生物科技企業股份有限公司
新北市汐止區大同路一段147號9樓
免費服務電話：0800-251-197

製造廠
美西製藥有限公司
高雄市仁武區仁武里工業一路9號

10802-送審-百克痛-療痠痛-凝膠-仿單-0220

印刷條件

無

設計人員	部門主管	研發部 確認	採購部 確認	需求單位 確認	董事長 裁示	總裁 裁示
謝錦雀		□中英成分、文字內容 □營養標示 □法規、警語 □批號/日期標示方式 □製造廠名、地址 □工廠證號 □藥證字號 □中英品名 □產品規格 □經銷商名、地址、電話 □建議售價 □免費服務專線 □特別標示 □廣告證號	□條碼字號 □保險資訊 □回收標示 (紙類、瓶器) □印刷規格			

◆核稿單位請發揮專業仔細校對，針對列表項目不足之處也請主動告知增列為校對標準。
◆列表之項目為基本校對舉樣，請全面考量仔細確認所有內容必須正確合乎現行法規。
◆內容選項勾選請確實，如內容選項沒有請打X。
◆內容請確實審核，如內容有誤，將依公司獎懲制度辦理。