

# “永勝”阿斯匹林栓劑 325 毫克

## (阿斯匹林)

### Aspirin Suppository 325mg “EVEREST”

本劑係水楊酸解熱鎮痛藥劑。作用於視丘下部之體中樞，擴張皮膚血管，致使發汗，而呈解熱作用。

【成分】每顆栓劑中含：

Aspirin..... 325mg

【適應症】

退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。

【用法用量】

發燒或需要時使用，若症狀持續，則每 4-6 小時可重複使用，每 24 小時內不可超過 4 次。

成人每次 1 顆，12 歲以上適用成人劑量。本藥不得剝半使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 五、栓劑限使用於肛門，若藥劑過軟時，請置於低溫待較硬後再使用。
- 六、不得併服含酒精飲料。

【警語】

- 一、使用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。
- 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 三、使用本類製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。
- 四、成人不得連續使用本類製劑超過 7 天，小孩不得超過 3 天，視情形需要，繼續使用本類製劑前，請洽醫師。
- 五、懷孕第 1、2 期婦女：除非醫師藥師藥劑生指示，不得自行使用。懷孕第 3 期婦女：不得使用。
- 六、不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。
- 七、本藥不得使用於 12 歲以下兒童，亦不得使用於 18 歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病-雷氏症候群 (Reye's Syndrome) 有相關性。
- 八、蠶豆症 (6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症, Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency) 患者，不得服用本藥。
- 九、本藥含 Aspirin，應注意下列事項：
  - (一) 酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能使用本藥，因為 Aspirin 可能造成胃出血。
  - (二) 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得使用本藥。
  - (三) 可能引起胃腸不適、胃腸出血、皮膚出疹、出血傾向、氣喘、耳鳴等不適症狀。
- 十、會造成直腸刺激感、腹部不適，腹瀉者不宜使用。

【賦形劑】Monoglyceride、Diglyceride。

【包裝】2-1000 顆塑膠瓶、錫箔盒裝。

【貯藏】存放於 25℃ 以下保存。

衛署藥製字第 036421 號