“瑞安”

定樂平（阿廷諾）

膜衣錠 100/50 毫克

〝Purzer〞

Tenolol (Atenolol)

F.C. Tablet 100/50 mg

瑞安大藥廠股份有限公司 PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP 衛署藥製字第 032322/036465 號 GMP優良藥品G-1682/3607號

本藥須由醫師處方使用

【成分名】Atenolol

【劑型、含量】膜衣錠：每錠含Atenolol ..... 100/50 mg

賦形劑：

100 mg： Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate,Corn Starch Magnesium Stearate, Sodium Lauryl Sulfate, Colloidal Silicon Dioxide, Hypromellose, Polyethylene Glycol, Titanium Dioxide

50 mg： Microcrystalline Cellulose, Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate, Sodium Starch Glycolate, Corn Starch, Magnesium Stearate, Sodium Lauryl Sulfate, Colloidal Silicon Dioxide, Talc, Polyethylene Glycol, Hypromellose, Tartrazine Aluminum Lake, Sunset Yellow FCF Aluminum Lake, Titanium Dioxide

【臨床藥理】

Atenolol是一種乙型腎接受體阻斷劑(β_1-Adrenergic Receptor Blocker Agent)，具有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，可降低心率及收縮力，對減除心絞痛病人之症狀有效，對高血壓的治療亦有效。口服單一劑量其藥效可達二十四小時之久；由於劑量範圍狹窄且作用迅速，很快便可看出藥物在病人身上效果，且服藥方法簡單，易被病人接受。

【適應症】

高血壓、狹心症

【用法用量】

1.成人：

(A)高血壓：起始劑量50mg可單獨每日服用1次，或與利尿劑及其它抗高血壓治療劑同時使用，若效果不明顯則提高到一天100mg，一般服用1-2星期就會有完全之療效。

(B)狹心症：起始劑量50mg每日1次，若一星期內效果不明顯則提高劑量到一天100mg，有些病人須提高到200mg才能達到適當效果。

2.兒童：本藥物尚無用於兒童之經驗，故不宜使用。

3.老人：劑量也許要減低，特別是腎功能不全的病人。

【禁忌】

1.患有二度或三度心臟傳導阻斷的病人不可服用本劑。

2.不可與**Verapamil**同時服用，若須服用**Verapamil**，則須事先停止使用本劑。

【注意事項】

1.未經治療的心臟衰竭患者，禁服本藥，若經過治療的心臟衰竭患者，可推介本藥物，但服用後若有鬱血性心臟衰竭的情況發生時，則應暫停使用。

2.本藥物藥理作用之一是降低心跳率，可能出現心跳緩慢現象，若發生此現象時可減少藥量。

3.本藥物是有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，所以患有慢性呼吸道阻礙的病人需小心使用，因它也可能引起氣喘病人的呼吸道阻礙。

4.患有心缺血病人，治療不可突然中斷，如果本藥物與**Clonidine**同時服用時，**Clonidine**不宜中斷服用，須直至本藥物停止服用後數天才可停止。

5.用於麻醉手術前，宜停用本藥物且間隔須四十八小時以上，如治療要繼續使用，麻醉劑如乙醚，**Cyclopropane**及**Trichloroethylene**宜特別注意，若發生**Vagal Dominance**，可以用**1-2 mg(I.V.) Atropine**解除。

6.本藥物是經由腎臟排泄，所以對嚴重腎臟機能失常的病人應依情況調整劑量。一般而言病人其**Creatinine Clearance**若為**15-35mL/min/1.73 m²**則服用劑量應為每日**50mg**；若小於為**15mL/min/1.73m²**則服用劑量應每隔一天服用**50mg**。

7.孕婦：像其它藥物，除非必要，否則最好不要服用。

8.**FDA Pregnancy Category**（懷孕用藥級數）：**D**

【過量處理】

過度心跳緩慢可用**Atropine 1-2mg**靜脈緩慢注射，若需要時，可加上乙型接受器興奮劑，如**Isoprenaline 25 μg**或**Orciprenaline 0.5mg**靜脈緩慢注射但必須防止血壓下降太低。

【副作用】

一般的副作用是由於本身藥理作用所引起的，但極少發生。

包括四肢冰冷、肌肉疲勞和心跳緩慢，至於其它乙型接受體阻斷劑常見的睡眠不寧，本藥物無此報告，很少有皮膚疹及乾眼之報告，若副作用無法加以解除則需考慮停止用藥，而停止使用是要漸進為之。

【儲存條件】室溫避光貯存。

【包裝種類】2-1000錠瓶裝、鋁箔盒裝。

瑞安大藥廠股份有限公司
地　址：台北市松山區光復南路1號12樓之2
製造廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠
廠　址：桃園市觀音區草漯里大同一路26號
服務電話：(02)2766-0887

C0100904