



"國嘉" 滅菌錠 300毫克 (每索匹林)

Metipine Tablets 300mg "Kojar" (Trimethoprim)

本品能抑制細菌對Folic Acid的新陳代謝作用而呈殺菌作用，本品在泌尿系統方面的療效頗佳。

【成份】 Each Tablet Contains :
Trimethoprim.....300mg

【賦形劑】
Microcrystalline Cellulose、Hydroxypropyl Cellulose、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake 5、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate

【適應症】
大腸桿菌、奇異變形桿菌、肺炎桿菌引起之感染症。

【用法用量】 本藥須由醫師處方使用。
使用與給藥方式
Trimethoprim是一種使用來治療微生物感染的抗菌劑，特別是尿道和呼吸道的感染。治療急性尿道感染的常用劑量是200mg，每天2次；每天200mg分1或2次給藥，或每天300mg一次給藥也被使用過，小孩給藥為6~8mg/kg/day，分2次給藥；小孩的建議劑量為6~12歲100mg每天2次，6個月~5歲50mg每天2次，2~5個月25mg每天2次，長期預防使用為晚上服用100mg，小孩則為2~2.5mg/kg，Trimethoprim也常使用於治療呼吸道感染，使用劑量和治療急性尿道感染相似，劑量20mg/kg/day分次給藥，亦曾使用於嚴重的病人。

【注意事項】

1. 禁忌：
 - a. 對本品產生過敏者。
 - b. 有嚴重血液障礙者。
 - c. 孕婦、授乳婦、新生兒、未熟兒。
2. 慎重投與：
 - a. 肝障害、腎障害者。
 - b. 高齡者。
 - c. 葉酸欠缺代謝異常者。
3. 副作用：
 - a. 血液：再生不良性貧血、溶血性貧血、顆粒球減少、血小板減少等現象。
 - b. 皮膚：Stevens-Johnson症候群(皮膚粘膜眼症候群) Lyell症候群(中毒性表皮壞死症)。
 - c. 過敏症：發疹、紅斑、水疱、瘙癢感、光線過敏等。
 - d. 消化器：下痢、腹痛、血便現象時應停止服用。
 - e. 肝臟：黃疸、GOT、GPT上昇。
 - f. 腎臟：BUN上昇、血尿等。
 - g. 神經系：頭痛、末梢神經炎、倦怠感、耳鳴、眩暈、發汗等。
 - h. 呼吸器：PIE症候群(發熱、咳嗽、喀痰等)。
4. 相互作用：

下列藥品會增強本品作用：Sulfanilamide系、Sulfonyluea系、Coumarin系。
5. 其他：
 - a. 動物實驗會引起甲狀腺腫及甲狀腺機能異常。
 - b. 本劑投與中，應定期作臨床檢查(血液、肝、腎功能檢查)。
 - c. 本品可使抗生素恢復殺菌作用，避免抗藥性細菌產生。

【包裝】
2~1000粒瓶、鋁箔盒裝。

【儲存】
室溫避光保存(25°C)。

PIC/S GMP  國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197