衛署藥製 字第 036513 號

"龍府" 感 冒 安 液

Kanmouan solution "Long Full"

97. 9. 03

【成分】: 每 1 ml 中含:

Acetaminophen	12 mg
Chlorpheniramine maleate	0.12 mg
DL-methylephedrine hydrochloride	0.48 mg
Potassium guaiacol sulfonate	3 mg
Caffeine anhydrous	1.5 mg

【適應症】: 緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛）。

【用法用量】: 一日 4 次。成人每次 8 ml，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 4 ml；3 歲以上未滿 6 歲，每次 2 ml；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】:

1. 爲防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。(25℃以下)
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
   (1) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
   (2) 服用本藥時不得併服其他藥品。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 本藥使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
6. 不得併服含酒精飲料。

【警　　語】:

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
   (1). 3 歲以下不建議自行使用。
   (2). 曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
4. 吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
5. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
6. 不要服用本藥超過七日。
7. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
8. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
9. 酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為 Acetaminophen 可能造成肝損害。
10. 本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：
    (1). 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
    (2). 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
11. 本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
12. 本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料 (如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

【包　裝】: 8~4,000 毫升玻璃瓶裝。

【儲存條件】: 25℃以下陰涼處。

製造廠：三能化學股份有限公司　地址：彰化縣秀水鄉中山路 201 號
委託者：龍府藥業有限公司　地址：彰化縣秀水鄉曾厝村大厝巷 30 號