

“龍德” 治風濕膠囊 200 公絲 (伊普)

TONSUHAW CAPSULES 200mg

"L.D." (IBUPROFEN)

衛署藥製字第 036531 號

1874 年 Salicylic Acid 之問世，著實促進了醫學上鎮痛，消炎等藥劑之臨床治療效果。其後數年間 Antipyrine 和 Phenacetin 之相繼開發加上數十年來 Aniline 系，Anthranilic Acid 系，Pyrazolone 系，Pyrazolidine 系及 Salicylic Acid 系之衍生物等之陸續推出，更增進了此類藥劑之臨床效果和治療適應性。惟此等藥劑仍嫌美中不足，對於各類病症及特異體質之臨床應用上仍未盡理想，諸如嚴重的胃腸障害，血液毒性及所謂比林系過敏反應等，其應用治療的範圍也因此而受到限制。

Ibuprofen 係 Phenylpropionic Acid 系中毒性輕、副作用小、藥理活性強的化合物，有鎮痛作用消炎作用，為此類藥劑中均等兼具消炎、鎮痛二種作用且能充分而完全地發揮其效用，臨床上廣用於整形外科、外科，耳鼻喉科、眼科婦科、產科泌尿科等各科領域，對於種種炎症性疼痛之治療而有著很高的評價。

【主要成分】：每粒含有：

Ibuprofen.....200.00mg

【特徵】：

1. 本劑有消炎作用、鎮痛作用，比常用 Aspirin, Phenylbutazone, Indomethacin 等作用更強，且二種作用均衡發揮藥理活性。
2. 本劑服用後 30~60 分鐘即可達到最高血中濃度，且可持續 4~6 小時，投與後 24 小時內有 70% 形成代謝物，經由尿中排泄，無蓄積作用。
3. 藥物的依存性試驗顯示本劑沒有 Morphine 的代用性、耽溺性及習慣性。

4. 本劑之急、慢性毒性甚微：mouse 的 LD₅₀ 為 1025mg/kg (♂) 與 900mg/kg (♀)；rat 的 LD₅₀ 為 1400mg/kg (♂) 與 1750mg/kg (♀)；以 80mg/kg 連用 6 個月亦無體重、發育情形、血液、組織學、解剖學上的變異。

5. 本劑不影響體內水分與電解質之平衡，亦不干擾荷爾蒙的代謝。

6. 本劑係 Phenylpropionic Acid 的衍生物，並非 Steroid，亦不屬於比林系，故對比林系藥物有敏性反應者也可以安心使用。

【效能】：

下記疾患及症狀之消炎鎮痛、慢性關節痠麻質斯、關節痛、關節炎、神經痛、神經炎、背腰痛。

【用法、用量】：

通常成人每次 1~2 粒，一日 3 次，兒童依年齡酌減之，指示用藥。

【注意事項】：

1. 使用消炎鎮痛劑治療乃為對症療法，而非原因療法。

2. 用於治療慢性疾患（慢性風濕性關節炎）時應考慮下列事項：

(1) 長期投與時，須定期作臨床檢查（尿液檢查、血液檢查及肝機能檢查），如發現有異常現象，則須採取減量或停藥等適當措施。

(2) 考慮採用非藥物性療法。

3. 用於治療急性疾患時，應考慮下列事項：

(1) 對於急性炎症，須考慮其病痛及發熱程度而給藥。

(2)原則上應避免長期使用同一類藥品。

(3)如有原因療法，則應採用。

4. 須仔細觀察患者之狀況，留意有否副作用發生，可能出現過度體溫下降、虛脫、四肢冷卻等症狀，對患者有高燒之幼兒及高齡或消耗性疾患之患者，給藥後尤須注意觀察患者之狀況。
5. 本藥可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投與。
6. 儘量避免與其他消炎鎮痛劑合併使用。
7. 對小兒及高齡患者，尤須注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投與。

【禁忌症】：

1. 消化性潰瘍患者。
2. 重症之血液異常患者。
3. 重症之肝障礙患者。
4. 重症之腎障礙患者。
5. 重症之心機能不全患者。
6. 對本劑過敏之患者。
7. 患有阿司匹靈（Aspirin）氣喘或曾有該病歷之患者。

【對下列患者須慎重投與】：

1. 曾有消化性潰瘍病歷之患者。
2. 患有血液異常或曾有此種病歷之患者。
3. 患有肝障害或曾有該病歷之患者。
4. 心機能障害之患者。
5. 曾有過敏症病歷之患者。
6. 支氣管氣喘之患者。

【副作用】：

1. 血液：可能會引起再生不良性貧血、顆粒性

球缺乏症、血小板減少等血液障害，故須做血液檢查並小心觀察，有異常狀況出現，必須立刻停藥。

2. 過敏症：有時可能會產生 Stevens-Johnson 症候群（熱、皮膚粘膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎）等症候群，Lyell 症候群（中毒性表皮壞死症），發疹或誘發氣喘等症狀，遇有此等過敏症狀出現時，必須立刻停藥。

3. 感覺器官：

(1)眼：可能會有視覺異常等症狀出現，若有此等症狀出現時，必須立即停藥。

(2)耳：可能出現重聽及耳鳴等症狀。

4. 肝臟：可能出現黃疸及氨基轉移酶（Transaminase）值異常等現象。

5. 消化器官：可能引起胃腸出血，遇有此等現象，必須立即停藥。有時亦可能會有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、胃部不快感等現象，或出現口內炎，便秘等症狀。

6. 精神及神經系統：有時會出現頭痛、暈眩及抑鬱等症狀。

7. 心臟血管系統：有時會出現低血壓等症狀。

8. 其他：可能會出現浮腫。

【孕婦及授乳婦人之投與】：

根據動物實驗報告，本藥對動物胎兒具有毒性，對孕婦及授乳婦人之安全性尚未確立，對於孕婦或可能懷孕之婦女及授乳婦人不要投與，室溫保存。

【包裝】：

6~1000 粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

製造廠：龍德製藥廠股份有限公司

地址：高雄縣永安鄉永工九路 2 號