


"居禮" 居安錠 3公絲(布馬平)

Culium Tablet 3mg (Bromazepam)

衛署藥製字第 036542 號 G-3646

「結構式」：



「成份」：每錠含

Bromazepam 3mg

「性狀」：

"居禮"居安錠係一種 Benzodiazepine 系之化合物，其抗緊張、焦慮效果最佳。

「適應症」：

焦慮狀態。

「用法用量」：

治療焦慮症：口服，1日 3~18mg(1~6 錠)，分 2~3 次服用，依病人症狀之輕重增減，對年老病人，應減半劑量服用。本藥須由醫師處方使用。

「作用」：

藥效藥理

抗不安作用：本品對植入大老鼠腦視丘下部之電極的刺激有抑制作用。

對中樞之覺醒反應腦波有抑制作用。

具睡眠麻醉之增強作用。

鎮痛作用。

肌肉鬆弛作用。

藥物動力學

1. 健康成人口服 5mg 後，2 小時可達血中最高濃度，之後逐漸減少，48 小時後血中仍存有微量。

「注意」：

1. 一般的注意，因內服會引起嗜睡，注意力、集中力、反射運動能力低下，故從事駕駛及危險機械操作者應注意，應避免使用。

2. 禁忌：

a. 患有急性狹隅角綠內障的患者。

b. 有重症肌無力之患者。

3. 慎重給藥：

a. 有心障礙、肝障礙、腎障礙之患者。

b. 有腦器質性障礙之患者。(易呈現過強之作用)

c. 乳兒小兒

d. 高齡者<易引起運動失調>

e. 身體衰弱者。

f. 中度以上呼吸不全之患者。

「副作用」：

a. 依賴性：大量連續使用，少部份有藥物依賴性產生，故使用時應注意觀察，並切勿過量使用。

於連續或大量使用後，不可突然中止投藥或減量，有時會發生抽筋發作，不眠、不安幻覺、妄想等戒斷症狀產生，故於必要中止投藥時，必須逐漸減量。

b. 精神神經系：

(a) 偶有嗜睡、暈眩現象。

(b) 有時會有過份興奮、步行失調、不眠、頭痛、影響性慾。振顫、視覺障礙、聽覺障礙等現象。若有以上症狀產生，則可減量使用，即會消失。

(c) 血液，有時白血球會減少。

(d) 肝臟，Alkali-phosphatase 值有時會上昇，或有 Urobilinogen 呈陽性反應。

(e) 循環系：偶有血壓下降。

(f) 消化系：偶有口渴、食慾不振、噁心便秘、胃部不快感等症狀。

(g) 過敏症：偶有出現發疹、發癢等過敏症狀，則應中止投藥。

(h) 泌尿系：偶有排尿困難。

(i) 骨骼，肌肉：有疲勞感、脫力感等。

5. 妊婦、授乳婦之投藥：

a. 據疫學調查報告，投予 Benzodiazepine 系化合物，曾有畸形兒、障礙兒出生之例，對妊娠三個月以內或可能已懷孕之婦女，投藥時應評估其有益性大於危險性時，始可投藥。

b. 對曾使用 Benzodiazepine 之孕婦，其新生兒有哺乳困難，肌肉緊張降低、嗜眠、黃疸增強等症狀，因此，對妊娠末期之孕婦投藥時，應評估其有益性大於危險性。

c. (內服)於分娩前連續服用 Benzodiazepine 系化合物，據報告，於產後其新生兒有發現戒斷症狀(神經過敏、振顫、過度緊張)等現象。

d. 據其他 Benzodiazepine 系化合物之報告，藥物會移行於母乳中，而使哺乳兒產生嗜眠、體重減輕，又可能增強黃疸，故授乳婦應避免使用，如有使用，則應中止授乳。

6. 小兒之投藥:無使用經驗依據，故安全性未確立。

7. 相互作用:

與下列藥物併用或飲酒，則藥效作用增強，故應慎重投與 Phenothiazine 系化合物 Barbiturate 系化合物 Monoamine 氧化酵素抑制劑。

8. 保存:室溫、阻光保存。

注意事項:使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。

「包裝」:

2-1000 粒，塑膠瓶、玻璃瓶、鋁箔包裝



信東化學工業股份有限公司居禮廠

台北縣淡水鎮忠山里中洲子 3 之 1 號