

"正和" 通血路膜衣錠 9.6 毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)

Ginkgo F.C. Tablets 9.6mg "C.H." (Ginkgoflavonglycoside)

【成分】 Each F.C. Tablet Contains :

有效成分及含量：Ginkgo Biloba Extract 40mg

(相同於 9.6mg 的 Ginkgoflavonglycoside：以 Quercetin、Kaempferol 及 Isorhamnetin 計算之)

其他成分(賦形劑)：Lactose Monohydrate、Microcrystalline Cellulose、PVP、Primojel、Silicon Dioxide、Stearic Acid、Talc、Allura Red AC Aluminum Lake、Yellow Iron Oxide、Sepifilm 752 White、PEG

【用途(適應症)】末梢血行障礙之輔助治療。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：對銀杏葉萃取物過敏的患者、十二歲以下的孩童、懷孕、近期將進行手術：因可能增加手術出血之風險。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - 1.癲癇病人：建議避免使用本藥，因本藥可能會誘發癲癇的發作。
  - 2.正在使用抗凝血劑、抗血小板藥品、非類固醇類抗發炎止痛劑：可能因藥物交互作用而發生不良反應之風險。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：正在使用任何藥品，包括不是經醫師處方之藥品。
- 其他使用上注意事項：
  - 1.因個人體質不同，個別病患服用本藥後之療效反應可能有所差異，無法盡如預期。
  - 2.使用本藥前，應先確認相關症狀並非因需要其他更確定治療之潛在疾病所引起。
  - 3.「手術出血風險」：如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥品，並在手術前七天停止使用。
  - 4.請務必遵照(用法用量)的指示方法服用，否則可能無法達到預期的療效。如有必要，請由醫師指示其他的用法用量。
  - 5.服用本藥品時請與開水一起服用。
  - 6.一天服用三次，請於每天早上、中午和晚上，於飯前或飯後服用。
  - 7.如果忘記服用或服用的劑量不夠時，請依照(用法用量)的指示方法繼續服用。
  - 8.月經期間請停止服用本藥品。
  - 9.請放置於陰涼處和孩童無法取得處。

【用法用量】

年齡	每日使用次數
成人	每次一錠，一日三次

【警語】

●服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

關係部位	症狀
消化系統	腸胃不適
神經系統	頭痛
皮膚過敏反應	紅、腫、癢

●服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1.使用本藥可能出現輕微的胃腸道不適(如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐)，亦可能出現嚴重之不良反應。
- 2.器官出血(如眼睛、鼻子)、腦出血(如劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差)、胃腸道出血(如吐血、黑便、血便)。
- 3.過敏性皮膚反應(如紅斑、皮疹、水腫、搔癢)。
- 4.如發生上述任一不良反應時，應立即請教醫師協助釐清是否因為服用本藥引起或是因其他原因所導致。
- 5.目前仍無因服用過量而導致不良反應之報告，但仍請細心觀察，如果發生不屬於上述的不良反應時，亦請通知你的醫師或藥師。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包裝】6 -1000 錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

【貯存】貯存於 25°C以下乾燥處。

【說明】"正和"通血路膜衣錠為銀杏葉萃取物，含有效的植物性治療物質 Quercetin、Kaempferol、Isorhamnetin，是一種植物性血管活化劑。它具有(1)末梢血管擴張作用(2)增加腦循環的血流量(3)能清除人體代謝過程所產生的過氧游離基，防止體內的脂質過氧化，故可抑制血小板凝集及微血管栓塞之形成(4)改善血液循環，調整適當血壓(5)隨時改善因四肢脈管痙攣所引起之疼痛。

衛署藥製字第 036588 號



正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區新工路 23 號(新營工業區)