

”木村”舒鼻膠囊

Anti Nassal Capsules "M.T"

成份：Each Capsule contains:

Carbinoxamine Maleate.....	4mg
Caffeine Anhydrous.....	50mg
Phenylephrine HCl.....	10mg

適應症：緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）。

用法用量：一日3次，每次間隔4小時以上服用。

成人每次1粒，12歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：一.為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

二.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三.除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

警語：一.服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。

二.除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

三.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。

四.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心臟機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。

五.老年人應小心使用本藥，3歲以下不建議服用。

六.如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。

七.服用本藥不得與酒精性飲料合用。

八.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。

九.服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。

十.連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。

十一.不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。

十二.本藥含Phenylephrine HCl，應注意下列事項：

1.除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。

2.服用Monoamine oxidase inhibitor (MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

十三.本藥含咖啡因成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

包裝：6~1,000粒鋁膠箔盒裝。

儲存條件：室溫(15~30°C) 儲存。

木村藥化企業股份有限公司
員林鎮中山路一段 110 號