



Panacomb

Panacomb

Panacomb

Panacomb

G-3782  
衛署藥製字第 036821 號

“皇家” 泛拿康 錠

Panacomb Tablets “Royal”

〔主 成 分〕：每錠含有：

Acetaminophen.....	325mg
Pseudoephedrine Hydrochloride.....	30mg
Chlorpheniramine Maleate.....	2mg
Dextromethorphan Hydrobromide.....	10mg

〔賦形劑〕：Ca.phosphate, dibasic、Arbocel M80、Ca.CMC、Sepifilm 3048、PVP K90、Mg.stearate、Talc、Primojel。

〔藥理作用〕：

1. Acetaminophen：具有解熱止痛效果，對胃沒有刺激。在口服後 70~160 分鐘達到血漿中最高濃度，半衰期約為 3 小時，主要在肝臟內與 Glucuronic acid 結合成 Glucuronide，然後由腎臟排出。
2. Pseudoephedrine Hydrochloride：扮演間接擬交感神經劑，刺激交感神經(adrenergic)末梢釋放 norepinephrine 的角色，使上呼吸道血管收縮，減輕鼻通道及竇的充血膨脹。半衰期約為 4.5 ~ 10 小時。
3. Chlorpheniramine Maleate：為一種 alkylamine-type 抗組織胺劑，主要作用於 H<sub>1</sub> receptor 的拮抗，其能阻止 histamines 從 dilating capillaries 釋放，及呼吸黏膜水腫，作用時間維持 4 ~ 6 個小時，半衰期為 12 ~ 16 小時。
4. Dextromethorphan Hydrobromide：其能提高咳嗽的閾值，沒有止痛或加成的特性，在投予後 15 ~ 30 分鐘即有止咳作用，於治療劑量內，其不會抑制纖毛的活動力。其能於胃腸道被吸收，在肝中代謝，且從尿中排出。

〔適 應 症〕：

緩解感冒之各種症狀(流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

〔用法用量〕：

- 一日 3 至 4 次，成人每次 1 錠。
- 12 歲以上，適用成人劑量。
- 9 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。
- 6 歲以上未滿 9 歲，適用成人劑量之 1/3。
- 未滿 6 歲之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

〔注意事項〕：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
  - 1) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
  - 2) 服用本藥時不得併服其他藥品。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生應立即停藥就醫。
5. 不得併服酒精飲料。

〔警語〕：

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - 1) 6 歲以下不建議自行使用。
  - 2) 曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
5. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、濃痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
6. 吸菸、慢性阻塞性肺炎疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
7. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
8. 不要服用本藥超過七日。
9. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
10. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
11. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol) 可能造成肝損害。
12. 本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：
  - 1) 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
  - 2) 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
13. 服用 Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) 或血清回收抑制劑型的抗憂鬱劑(Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) 者，不得使用含 Dextromethorphan 之本藥。
14. 本藥含 Pseudoephedrine hydrochloride，應注意下列事項：
  - 1) 除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
  - 2) 服用 Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) 期間，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥。如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。

〔包裝〕：6 ~ 28 錠鋁箔盒裝，室溫(15-30℃)儲存。



皇家化學製藥股份有限公司

ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.

高雄市鳥松區裕埔路一巷 1 號 電話：(07)7310537  
傳真：(07)7310538