

“長安”

外用

傷口消毒液 (普維酮-碘)

Disinfectant Solution “C.A.” (Povidone-iodine)

成分： Each ml Contains:

Povidone-iodine 100 mg
(eq. to available iodine 10 mg)

賦形劑： Purified Water。

說明：

傷口消毒液是採用 (iodine) 及人造血漿 (PVP) 形成錯化合物，其為一種用途廣泛的廣效抗菌劑且對革蘭氏陽性菌、陰性菌，黴菌，酵母菌及原形動物皆有效。

適應症：傷口消毒。

用法用量：以棉球沾之塗於患部。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

配合禁忌：鹼性溶液及還原性物質均會降低本品之殺菌力。

注意事項：

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。

警語：

1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 碘過敏者不能使用。
3. 有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及授乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
4. 會使皮膚或衣物染色。

儲存條件： 25°C 以下避光儲存。

包裝規格：4000 毫升以下塑膠瓶裝。

GMP
G-3797
衛署藥製字第 036847 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號