

高尿酸血症改善劑

政

“富生”立康錠 50公絲(本補麻隆)

Licon Tablets 50mg “F.S.” (Benzbromarone)

G.M.P G-3801

衛署藥製字第036851號



G.M.P

【主要成分】：每錠含有：

Benzbromarone.....50mg

【適應症】：痛風、高尿酸血症

【用法用量】：(1) 痛風：一天一次，每次25mg或50mg，以後維持量每次50mg，每天1-3次。

(2) 高尿酸血症及其伴隨之高血壓症：每次50mg，每天1-3次。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

一. 一般注意：

- (1) 急性痛風發作時不可給予。
- (2) 血中尿酸降低顯著，投與初期有引發痛風現象。
- (3) 尿液酸性情況下，易引起尿酸結石，並引發血尿、腎痛，為防止以上症狀，患者宜多喝開水，以提高尿量，及使其尿液鹼性化，並特別注意酸鹼平衡。
- (4) 長期投與本品患者，宜定期作肝功能檢查。
- (5) 腎功能異常之患者，建議酌予減量。
- (6) 重度肝功能異常之患者應小心使用。

二. 禁忌：

- (1) 伴隨腎結石患者，高度腎機能障礙者。
- (2) 孕婦及可能懷孕之婦女。

三. 副作用：

- (1) 過敏症：蕁麻疹、發疹、顏色發紅、紅斑、搔癢感。
- (2) 肝臟：S-GOT、S-GPT、alkali-phosphate 值均上升。
- (3) 胃腸道：胃痛、腹痛、胃部不快感、胸悶、噁心、下痢、軟便、口乾。
- (4) 其他：偶有浮腫、心窩不快感、頭痛。

四. 孕婦投與：動物實驗，有畸胎作用，孕婦及可能懷孕之婦女，儘可能避免使用。

【藥效藥理】：

- (1) 藥理作用：痛風患者投與結果，血清尿酸值下降，尿酸清除率(clearance)上升，肌酸酐清除率(creatinine clearance)沒有變化，血清尿酸值下降是由於尿酸儲存減少，因為尿酸一天生產量不會有明顯變化的，所以本品對尿中尿酸排泄有選擇性的促進作用。
- (2) 作用機序：健康人投與本品，penicillin 及 phenolsulfon-phthalein 的排泄及血中濃度不受到影響，這有異於 probenecid 抑制腎小管對於尿酸的再吸收。

【包裝】：6-1000錠塑膠瓶裝

【儲存】：25°C以下

富生化學製藥股份有限公司

台中市工業區 23 路 19 號

TEL : (04)23590538 FAX : (04)23590182