“井田”

井聯[®]乳膏

CHIN LEIN[®] Cream "Chinteng"

—綜合性皮膚疾患治療劑—

衛署藥製字第036894號
G-3841

本藥含有四種不同作用的藥品成分，具有抗發炎、止癢、殺菌和殺黴菌作用，用於緩解多種皮膚症狀。

【成分】：

有效成分及含量：每公克含 (Each gm contains)：

Betamethasone(as valerate).....0.5mg
Gentamicin (as sulfate).....1.0mg (potency)
Tolnaftate.....10mg
Iodochlorhydroxyquin.....10mg

其他成分 (賦形劑)：N-80、Cety Alcohol、Glyceryl Monostearate、Polyoxyethylene(25) Cety Ether、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Isopropyl Myristate、E.D.T.A. 2Na、Propylene Glycol、Paraffin Oil、Fragrance (Sahara 8997)、Tartrazine、Purified Water.

【用途(適應症)】：急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染；治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑、濕疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (二)有皮膚結核、急性單純疱疹、天花、水痘的人
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：
 - (一)3歲以下。
 - (二)有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二)正在接受醫師治療。
 - (三)患部在臉上。
 - (四)患部化膿。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量或使用次數。
 - (四)使用部位或其周圍出汗時，請洗乾淨後再用藥。
 - (五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 - (六)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
 - (七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立即以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 - (八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
 - (九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 - (十)請勿使用超過7天以上。
 - (十一)本藥稍會污染衣物。
 - (十二)請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
 - (十三)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
 - (十四)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
 - (十五)臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
 - (十六)癬癬或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

【用法用量】：將本軟膏塗擦於患處，每天二至三次，或依醫師指示使用。治療時間之久暫視症狀之進展而定，足癬可能需2~4週之治療。

【警語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。 搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、皮膚炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後，若有發生下列症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1.若有上述外之其他不適情況產生。
- 2.使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
- 3.一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4周，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫，如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】：100公克以下鋁軟管、100公克以下、250公克、450公克、750公克、1000公克塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】：本品請置於25°C以下，並避光存放。

井田國際醫藥廠股份有限公司 製造
台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號
冠丞生技股份有限公司 代理
花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路二段297號
諮詢專線：(03)8537922