〝杏輝〞 G.M.P.藥品

抑疼炎 腸溶膜衣錠50公絲(待克菲那)

VALTAFEN Enteric F.C. Tablet 50mg 〝Sinphar〞

(Diclofenac)

—— 解 熱 鎮 痛 劑 ——

1.本劑主成份為Diclofenac鈉鹽(是一種2-aminobenzeneacetic acid的衍生物）為一強效作用的非固醇類消炎劑，如同一般 NSAIDs 主要抑制前列腺素合成及抑制發炎反應所釋放的 PG，而達良好的消炎、鎮痛、解熱作用。

2.口服投與由胃腸道吸收快速且完全，2～3小時後可達最高血中濃度；血中濃度與劑量大小成線性比率。

成　　份：每錠含：

Diclofenac Sodium.....50mg

適應症：類風濕性關節炎、腱炎、骨關節炎、滑囊炎及其他關節或關節周圍疾患之消炎、鎮痛。

用法用量：

成人每日75～100mg分2～3次服用
兒童每日0.5～1mg/per kg分次服用
骨關節炎每日100～150mg分次服用
類風濕性關節炎每日150～200mg分次服用
關節黏連性脊椎炎每日4次每次25mg，需要時睡前25mg

注意事項：

1.禁用於對aspirin、NSAIDs 過敏會引起氣喘，蕁痲疹或其他過敏反應之患者。

2.本劑對腸胃有造成潰瘍或出血之情形，當有潰瘍或胃腸出血產生應立即停藥。

3.長期投與可能造成肝、腎臟功能損害與抑制血小板凝集延長凝血時間，建議若長期治療須定期做肝、腎臟功能檢查及血液計數。

4.本劑與下列藥物會產生藥物交互作用：

(1)本劑與抗凝血劑雖無短期投予交互作用產生之臨床報告，但在其可能造成腸道出血的安全考慮之下，本劑若與抗凝血劑併用必須減量。

(2)本劑有抑制利尿劑的作用，與鉀離子利尿劑併用會增加血中鉀離子的濃度；本劑與triamterene併用，增加腎毒性。

(3)本劑與methotrexate併用，增加methotrexate的血中毒性及腎毒性。

(4)本劑與digoxin併用，會增加digoxin的血中濃度。

(5)食物或制酸劑會延長本劑胃腸吸收時間，但不影響吸收量。

5.孕婦懷孕後期及授乳婦女盡可能避用本劑。

6.副作用：皮膚方面－浮腫、發疹、蕁痲疹等症狀。
胃腸道－噁心、嘔吐、下痢、上胃部疼痛、腹部痙攣，較少有胃腸出血、消化性潰瘍症狀。
肝臟－血中SGOT、SGPT增加。
中樞神經－頭痛、眩暈。

保存：本劑請防濕、避光、室溫貯存。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第037603號
G-4196號

包　　裝：1000錠以下鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

G.M.P.
® 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台 灣 宜 蘭 縣 冬 山 鄉 中 山 村 8 4 號
84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN
服務專線：(0800)021053、015151　　web site : http : //www.sinphar.com