

# 廣效性抗黴菌劑

## “汎生” 克催瑪汝 乳膏 20 公絲 / 公克

### Clotrimazole Cream 20mg/Gm “Panbiotic”

衛署藥製字第 037607 號 G-4200

#### [特 徵]

本品主成分 Clotrimazole 為一新合成之廣效性抗黴菌劑，對黴菌具殺滅功效。

#### [主成分]

乳膏每 Gm 含有：

Clotrimazole.....20mg.

#### [賦型劑]

Propylene Glycol、Liquid Paraffin、I.P.M.-K、Cetyl Alcohol、Tween 80、Stearil Acid

Methyl Paraben、Propyl Paraben、Benzyl Alcohol、Glyceryl Monostearate

Spearmint Oil、Water Purified

#### [構 成]

本劑乳膏：白色水溶性乳膏。

#### [藥理作用]

1. 殺黴菌劑：破壞黴菌之細胞膜而改變其細胞膜的穿透性，使得細胞組成必要物質喪失。
2. Clotrimazole 可抑制致病性皮膚病原菌，酵母菌和馬辣塞菌屬 (*Malasseia furfur*) 之生長。體外試驗上，Clotrimazole 對分離出之紅色髮癬菌 (*Trichophyton rubrum*)，鬚瘡小芽胞癬菌 (*Trichophyton mentagrophytes*)，表皮癬菌屬 (*Epidermophyton floccosum*)，犬小芽胞菌屬 (*Microsporum canis*)，英膜組織漿菌屬 (*Torulopsis capsulatus*)，溶組織串菌屬 (*Torulopsis histolytica*) 和白色念珠菌屬 (*Candida albicans*) 均有殺滅作用，對白色念珠菌屬或鬚瘡小芽胞癬菌連續治療亦不會產生抗藥性。
3. 本藥可穿透皮膚，但系統吸收極微。

#### [適應症]

由表皮癬菌、酵母菌、黴菌引起之真菌性皮膚感染症、足癬、香港腳、花斑糠疹、甲溝炎、念珠菌陰唇炎、念珠菌龜頭炎及汗斑。

#### [用法用量]

乳膏：一日 2~3 次塗敷於患部。在症狀消失後，應繼續治療十四天以求根治。

本藥須由醫師處方使用。

#### 注意事項：

1. 本藥對孕婦之安全性尚未確立，但應就其使用上的危險與效益加以考慮，因其有微量可為系統吸收。
2. 對哺乳者之安全性尚未確立。
3. 使用本藥如有下列副作用時，應予醫療照應：皮疹、麻疹、水泡、灼熱感、脫皮、紅腫、刺痛感腫脹或其他皮膚刺激現象。
4. 對本藥有過敏者應勿使用。
5. 應按照指示作全程治療，如果有遺漏施藥，應立刻塗敷，但接近下次投藥時間則免。
6. 避免將本藥觸及眼睛，避免將塗藥部位覆蓋，除非醫師指示。
7. 使用本藥四週後，如果皮膚疾患未改善，則應請醫師檢討診斷。[注意] 患部應保持衛生，以控制感染或再感染之來源。
8. 局部抗黴菌劑之使用可能導致皮膚敏感，隨後治療藥之局部使用亦可能導致過敏反應。
9. 通常在治療的第一週內，搔癢症就會減輕，如本藥用來治療 Candidiasis 應避免閉塞性敷料之使用，因為它們提供了有利酵母菌生長之條件，並且釋出刺激之內毒素。

[包裝]：乳膏：5Gm；10Gm；20Gm/鋁軟管裝，450Gm/塑膠罐裝。

[儲存]：25°C 以下避光貯存。



臺灣汎生製藥廠股份有限公司

高雄市鳥松區埤埔村大同路 5-1 號 電話：(07)7317861