

# 仿單標籤粘貼表

產品名稱	“應元”血利通滴劑 9.6 毫克 (銀杏葉類黃酮配醣體)	申請廠商	應元化學製藥股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製	字 第	037668 號

S-520

衛署藥製字第037668號 (G-4230)

“應元” 血利通滴劑 9.6毫克  
(銀杏葉類黃酮配醣體)  
Cirliton Drops 9.6mg “Y.Y.”  
(Ginkgoflavonglycosides)



【成分】每公撮中含有：

Ginkgo Biloba Extract.....40mg  
(Eq. To 9.6mg Ginkgoflavonglycosides Calculated as Quercetin, Kaempferol and Iisorhamnetin)

賦形劑：

Sodium carbonate anhydrous, Sodium dehydroacetate, Orange flavor, Purified water.

【適應症】

末梢血行障礙。

【用法用量】

除非醫師另有指示。取20滴加入少量水稀釋後服用，一日3~4次。(添附1ml滴管)

本藥須由醫師處方使用

註：20滴滴液相當於1公撮。

【警語及注意事項】

- 「手術出血風險」：「如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥品，並在手術前七天停止使用。」
- 「不良反應」：「依據案例報告、臨床研究及上市後資料顯示，使用含銀杏葉抽出物成分 (Ginkgo biloba extract) 之藥品，可能發生以下不良事件，包含器官（如眼睛、鼻子、大腦和胃腸道）出血、頭痛、頭暈、輕微的胃腸道不適（如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐）及過敏性皮膚反應（如紅斑、皮疹、水腫、癢癢），嚴重者甚至可能發生過敏性休克。」
- 「特殊族群」：癲癇病人：建議癲癇病人避免使用含銀杏葉抽出物成分 (Ginkgo biloba extract) 及已知會降低癲癇發作閾值之藥品。癲癇病人服用銀杏製劑產品，無法排除該品會促使其下一次癲癇的發作。

【禁忌】：懷孕。

【藥品交互作用】

- Ginkgo biloba與抗凝血劑（如phenprocoumon或warfarin）或抗血小板藥品（如clopidogrel、acetylsalicylic acid及NSAIDs等）併用可能會影響抗凝血劑或抗血小板藥品之作用。
- Ginkgo biloba與warfarin合併使用時，建議應於開始合併使用、改變劑量、停止或更換使用銀杏製劑時，進行凝血功能監測。
- Ginkgo biloba可能具有抑制P-glycoprotein作用，而因此增加P-gp受質藥品（如dabigatran）之暴露，建議合併ginkgo biloba與P-gp受質藥品時應謹慎使用。

【包裝】

6~4000ml玻璃瓶裝。



應元化學製藥股份有限公司  
台灣台南市安平工業區新忠路26號 TEL:(06)2654883(代表號)