



"永勝"

普疏痛膠囊250公絲

(每非那)

Bonstan Capsules 250mg "EVEREST" (Mefenamic Acid)

本品所含成分Mefenamic Acid係非麻醉性鎮痛解熱劑具有末梢性抗炎症作用及中樞性解熱鎮痛作用，由多年的臨床試驗結果證實本品效果卓越，且不具成癮性，最適合治療各種發炎症狀，為極優良的抗炎鎮痛劑。

【成分】

每Cap內含：

Mefenamic Acid.....250mg

【適應症】

肌肉痛、神經痛、關節痛、腰酸背痛、月經痛、手術後之消炎鎮痛、炎症腫脹痛、齒痛、副鼻腔炎

【用法用量】

成人初量為二粒，而後可按需要每六小時服一粒，六個月以上兒童，依體重每公斤6.5mg，每六小時至八小時服用一次。

本藥須由醫師處方使用

【警語及注意事項】

1. 本品胃腸刺激極少，但長期繼續每天服用，曾有腹瀉的病例，若有腹瀉應即停止用藥。
2. 患有腎臟功能不佳之患者，須在醫師指示下使用。
3. 服用本品，偶而會發生斑丘疹狀，停藥後，即自然消失。
4. 對肝臟之影響：服用NSAID類藥品（包括：Mefenamic acid）之患者中，最高有15%可能發生單一或多項肝功能指數略為增加之情形。繼續治療後，這些檢查值異常現象可能會惡化、保持不變，或只是短暫現象。在NSAID類藥品之臨床試驗中，約有1%之患者通報ALT或AST顯著升高（約為正常值上限之3倍以上）。此外，曾被通報之罕見嚴重肝臟不良反應案例，包括：黃疸及致命之猛爆性肝炎、肝壞死、肝衰竭，其中一些為死亡案例。在Mefenamic acid治療期間，若患者出現肝功能異常之病徵及/或症狀，或肝功能指數異常時，應評估是否發展成更嚴重之肝臟不良反應。若出現肝病之臨床病徵及症狀，或全身性症狀（例如：嗜伊紅性白血球增加、皮疹等），應立即停藥。

【副作用】

肝膽副作用：單一或多項肝功能指數略為增加、膽汁鬱滯性黃疸、輕度肝毒害、肝炎、肝腎症候群。

【賦形劑】 Lactose、Silicon Dioxide AD-102、Microcrystalline Cellulose 301、Magnesium Stearate。

【硬空膠囊】主成分：Gelatin。賦形劑：Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine。

【包裝】 8~1000粒塑膠瓶裝。

衛署藥製字第037740號



嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686(代表號)