# "永昌" 普樂凝膠 5毫克/公克(匹若卡)

Pro Gel 5 mg/Gm "Y.C" (Piroxicam)

衛署藥製字第037805號 G4282

【成　　分】：每公克凝膠含有：

主成份：Piroxicam.....5mg

賦形劑：Carbomer、Alcohol、Propylene Glycol、Menthol、Methyl Salicytate、Diethanolamine

【適 應 症】：骨關節炎(關節病，退化性關節病)，類風濕性關節炎，外傷後，肩關節周圍炎之消炎鎮痛。

【用法用量】：本劑僅供外用，不需使用封閉敷料，塗擦本劑時要徹底，皮膚上不要殘留藥劑，按患處塗擦的表面積而定，使用0.5-1.5公克(即1.5-4.5公分凝膠劑；相當於5-15毫克匹若卡)，一天擦拭2-4次，未滿18歲由醫師處方使用。

1.禁忌：

a.普樂凝膠劑不可使用於對本品或其他匹若卡劑曾有過敏的病人，本品對阿斯匹靈以及其他非類固醇抗炎劑可能有交叉感受性。

b.普樂凝膠劑不可使用於對阿斯匹靈和其他非類固醇抗炎劑會產生氣喘，鼻炎，血管水腫或蕁麻疹的病人。

2.警語：

懷孕期間使用：

雖然動物服普樂的實驗，並無畸胎發現，但懷孕期或受孕期使用普樂的安全性尚未建立，和其他非類固醇抗炎劑一樣，普樂經由可逆抑制cyclooxygenase酵素而抑制前列腺素的合成與分泌作用，可能使妊娠動物發生難產或分娩延遲，非類固醇抗炎劑已知能引起嬰兒動脈導管之閉合，初期研究顯示口服普樂後母奶中的濃度約為母體血漿中濃度的1%，基於安全性尚未建立，因此普樂凝膠劑不推薦哺乳期的婦女使用。

小孩之使用：

對小孩之劑量和適應症尚未建立。

3.注意事項：

如果局部刺激反應產生，應停止本劑之使用，需要的話可施以適當治療，請勿使用本劑於眼睛，黏膜或開放的皮膚傷口及任何在使用本劑後會影響使用部位的皮膚狀態。

4.不良反應：

與治療有關的不良反應偶爾會發生，由臨床試驗所見的不良反應包括輕度中度局部刺激反應，紅斑，紅疹，鱗狀落屑，搔癢和使用部位有關局部反應，有時凝膠劑擦的不夠底會造成輕微且暫時性的皮膚斑色或衣服被著色現象。

【包　　裝】：1000Gm以下軟管裝，塑膠瓶裝

【儲存條件】：本品包裝於緊密容器，儲於陰涼(15~30°C)且孩童不易取得處。

委託者：永昌藥品股份有限公司
台中縣大甲鎮光明路140號3樓
TEL:(04)26877114~5
FAX:(04)26872442
製造廠：利達製藥股份有限公司
台中縣大甲鎮中山路一段906號