

# 完疲 痠痛膠囊 20毫克(匹洛卡)

Toricam Capsules 20mg (Piroxicam)

【成分】每粒膠囊中含有：

Piroxicam ..... 20mg

【適應症】

類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎。  
急性肌肉骨骼損傷、急性痛風和原發性痛經、幼年型慢性關節炎。

【用法用量】

1. 類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎：  
初劑量可用每天20毫克(1粒)用一次。大多數病人的維持量也是每天20毫克(1粒)，有些病人的維持量是每天30毫克，分成一次或幾次使用，少數病人的維持量可以減少到每天10毫克，長期服用每天30毫克以上的劑量，會增高胃腸副作用發生可能性。
2. 急性肌肉骨骼損傷：  
最初兩天給予每日40毫克(2粒)，分成一次或幾次服用，然後每天服用20毫克(1粒)，全部治療期是7~14天。
3. 急性痛風：  
最初每天一次40毫克(2粒)，然後每天給予40毫克(2粒)，持續4~6天，每天分成一次或幾次服用。痛風病人不能長期服用piroxicam。



本藥須由醫師處方使用  
衛署藥製字第037868號  
GMP優良藥品G-4316號



通過PIC/S GMP優良藥廠  
五洲製藥股份有限公司  
桃園市新屋區赤欄里17-1號

由此展開

# 完疲 痠痛膠囊


(匹洛卡) 20毫克

不含類固醇抗炎止痛劑

10粒裝

# 完疲 痠痛膠囊

20毫克(匹洛卡)  
Toricam Capsules 20mg (Piroxicam)



/ 緩解關節炎 / / 關節痛 /  
/ 急性痛風 / / 急性肌肉骨骼損傷 /

條碼

4712462309114

製造批號： 保存期限：

請詳閱說明書後使用

S29  
v1.00

# 完疲 痠痛膠囊

20毫克(匹洛卡)

完疲 痠痛膠囊  
20毫克(匹洛卡)