“信東” 伏脂膜衣錠600公絲（健菲布酯）

Gem-S F.C. Tablets 600mg（Gemfibrozil）

【成　　分】
主成分：Each F.C. Tablet Contains：
Gemfibrozil.....600mg
賦形劑：Starch Pregelatinized、Microcrystalline Cellulose、Polysorbate 80、Calcium Stearate、Hydroxypropyl Methylcellulose、Opaspray White、Wax Polishing。

【臨床藥理】
Gemfibrozil可以降低人類和動物血中之膽固醇(Cholesterol)及三酸甘油脂(Triglycerides)之濃度。雖然Gemfibrozil在若干化學結構上與Clofibrate類似，但在老鼠、猴子和狗的藥理實驗中顯示，Gemfibrozil與Clofibrate在藥效和治療專一性上，有極大的差異。臨床上證實Gemfibrozil之有效性和安全性的實驗包括長期和短期的研究，及比較Gemfibrozil和Clofibrate的研究，並以Placebo當對照實驗，研究結果顯示，使用Gemfibrozil治療3-24個月，能有效治療Fredrickson Type I a，II b，III．IV．V，及因糖尿病引起之高血脂。因高血脂而造成之黃瘤(Xanthomata)在治療期間可減小或甚至完全消失。

研究指出，Gemfibrozil可以減少Total Serum Cholesterol，Total Serum Triglycerides, VLDL Cholesterol和Triglycerides，並會升高HDL Cholesterol，因而可以減少罹患冠狀動脈心臟疾病之機會。

比較Gemfibrozil及Clofibrate的研究結果顯示，Gemfibrozil可能較為顯著地升高HDL Cholesterol，由於HDL Cholesterol含量的增加，被認為與降低冠狀動脈心臟疾病罹患率有直接關係，因此Gemfibrozil持續而顯著地升高HDL Cholesterol之特性，使其有別於一般降血脂藥物。

【適 應 症】
高脂血症。

【用量．用法】
常用量每日1200mg，分2次服用。
本藥須由醫師處方使用。

【副 作 用】
Gemfibrozil之耐受性佳，主要之副作用多半是胃腸不適，但通常不嚴重而不會造成停藥。

【禁忌及注意事項】
1.Gemfibrozil禁用於肝、腎功能不全之病患。
2.在老鼠、狗和猴子之急性及亞急性毒性研究並無病理上致病之報告，在生育研究中，也不會造成畸胎性。Gemfibrozil對生育系統並無影響，但孕婦使用之安全性仍待建立。Gemfibrozil並無致癌性。
3.使用抗凝血劑之病人服用Gemfibrozil應加小心，抗凝血劑量應減少一半(視個人而異)，以保持一定之Prothrombin time，以防止流血之併發症，並定期作Prothrombin之檢查，以保持Prothrombin量之穩定。

【包　　裝】
4～1000錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。
衛署藥製字第038016號G-4371

【貯　　存】
請放置於15～30℃處貯存，並注意須避光、乾燥之場所。

信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號
54070200⑥

煜_如_1041023-54070200⑥_伏脂膜衣錠600公絲說明書_100x215mm