



佳得胃[®] 注射液25毫克/毫升(雷尼得定) Getway Injection 25mg/ml (Ranitidine)

佳得胃注射液係組織胺H₂-接收器之拮抗劑。抑制基礎的或由組織胺(Histamine)、咖啡鹼(Caffeine)、食物(Food)、迷走神經(vegal nerve)引起的胃酸分泌，減少十二指腸潰瘍之發生與疼痛。亦沒有Cimetidine拮抗男性激素而引起性機能阻礙與乳房腫大的不良作用。

【藥理作用】

- 1.係組織胺H₂-接受器上組織胺作用之競爭性、可逆性抑制劑。
- 2.能抑制基本的及由Betazole激發的胃酸分泌，既減少分泌量，亦降低其中的酸和胃蛋白酶含量。
- 3.抑制胃酸分泌，減輕十二指腸潰瘍病人之白天及夜間疼痛。
- 4.抑制胃酸分泌，減少Zollinger-Ellison綜合症狀病人之過度分泌所致下痢、食慾減退、疼痛之發生。

【成分】 Each ml contains :

Ranitidine Hydrochloride 27.9 mg

eq. to Ranitidine 25mg

賦形劑：Potassium Phosphate Monobasic、Sodium Phosphate、Phenol、Disodium Edetate、Water For Injection

【適應症】

住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的)十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。

【用法用量】

- 1.成人
 - a.肌肉注射：每6-8小時50mg (2ml)
 - b.靜脈注射：每6-8小時50mg (2ml)，以0.9%NaCl或其他相容性之靜脈注射用溶液稀釋至濃度不超過2.5mg/ml (20ml)，以每分鐘不超過4ml的速率來注射(5分鐘)。
 - c.靜脈滴注：每6-8小時50mg/2ml，加入5%Dextrose或其他相容性靜脈注射用溶液中稀釋至濃度不超過0.5mg/ml。(100ml)
 - d.一般一天劑量最好不要超過400mg.
 - e.嚴重腎功能不良的病人，若其清除率(Creatinine clearance)低於50ml/min，建議劑量為每18-24小時給予50mg在病況嚴重之病人。緊張性潰瘍而致出血之預防，或消化性潰瘍而致出血病人復發性出血之預防，可以繼續使用胃腸外給藥，直至口服法開始。會酸吸引之危險病人，於誘導全身麻醉之前45-60分鐘，緩慢靜脈投與佳得胃注射液50mg。
- 2.兒童：佳得胃注射液應用於兒童的情況尚未被評論。
- 3.佳得胃注射液可與下列的靜脈滴注液配合使用。
 - a.0.9%氯化鈉BP
 - b.5%葡萄糖BP
 - c.5%碳酸氫鈉BP

佳得胃注射液與上述滴注液的混合注射，應於二十四小時內使用完，未用完即應丟棄。

本藥限由醫師使用。

【注意事項】

組織胺H₂-拮抗劑可能掩飾胃癌的併發症，因而延誤診斷。

當懷疑是胃潰瘍時，非惡性才採用佳得胃注射液治療。Ranitidine經由腎臟排泄，因此患有嚴重腎損傷情況，血漿的Ranitidine濃度水平增加，此類病人宜以25毫克投藥即可。佳得胃注射液穿過胎盤，但於分娩或進行剖腹生產術者所投與的治療劑量並不會對分娩產術或新生兒發育產生不良作用。Ranitidine亦排泄於母乳中，餵乳期間只在認為必要時才使用佳得胃注射液。

【副作用】

- 1.短暫的和可逆性的肝功能變化。
- 2.罕見有可逆性白血球減少症和血小板減少症。
- 3.罕見有過敏性反應(風疹、血管神經性水腫、支氣管痙攣、低血壓)。
- 4.偶有眩暈、頭痛症狀。

以上副作用，在很多醫案中均未確定是否與Ranitidine有關。

【禁忌症】

Ranitidine禁用於已證實對此藥產生過敏之病人。

【儲存條件】

25°C以下避光儲存。

【包裝】

2毫升安瓿裝，100支以下盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠:台南市新市區中山路182號