

“信隆”  
感風安膠囊  
Kanfonan Capsules “S.L.”

## 【作用】

- Acetaminophen(非阿斯匹林解熱鎮痛劑)-減輕感冒所引起全身的疼痛，並具解熱功能，藥效溫和，不刺激腸胃。
- Caffeine Anhydrous (中樞神經興奮劑)-具有中樞神經興奮作用。
- Ethoxybenzamide (解熱鎮痛劑)-具有解熱鎮痛作用。
- Tioepidine Hibenzate (鎮咳劑)-具有鎮咳作用。
- Chlorpheniramine Maleate (抗組織胺劑)-為抗組織胺藥，緩解流鼻水、打噴嚏等症狀。
- dl-Methylephedrine HCl (支氣管擴張劑)-能緩解支氣管痙攣引起的症狀(例如:咳嗽)。
- 由於六種成分之作用，可緩解感冒之各種症狀。

## 【成分】

## 有效成分及含量(每膠囊含)：

Acetaminophen.....100mg      Tioepidine Hibenzate.....13.3mg  
Caffeine Anhydrous.....33mg      Chlorpheniramine Maleate.....2.5mg  
Ethoxybenzamide.....167mg      dl-Methylephedrine Hydrochloride....10mg

其他成分(賦形劑)： Lactose、Light Anhydrous Silicic Acid、Magnesium Stearate  
(膠囊殼)： Brilliant Blue FCF、Gelatin、Purified Water、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Titanium Dioxide

## 【用途(適應症)】

緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、咯痰)。

## 【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：  
曾經因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (1) 18歲以下。
  - (2) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
  - (3) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
  - (4) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、青光眼，及因前列腺腫大引起之排尿困難的人。
  - (5) 有心臟病及65歲以上的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師：
  - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (2) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
  - (3) 同時服用含 Acetaminophen 成份之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
  - (4) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 其他使用上注意事項：
  - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (2) 避免陽光直射。
  - (3) 勿超過建議劑使用量。
  - (4) 不要服用本藥超過七日。
  - (5) 服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
  - (6) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。
  - (7) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
  - (8) 不得與酒精性飲料併用。
  - (9) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

## 【用法用量】

年齡	每日用量
成人及18歲以上	一次1粒，一日3次。

## 【警語】

一.服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化系統	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有任何不適情況產生。
- (2) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、濃痰、疹子或持續性頭痛。
- (3) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (4) 喉嚨疼痛持續兩日以上併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (5) 服用過量〔每日超過 Acetaminophen 4000 毫克(mg)〕，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (6) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

- 【包裝】 6 - 1,000 粒 鋁箔盒裝及塑膠瓶裝
- 【類別】 醫師藥劑師藥劑生指示藥品
- 【儲存】 室溫 25℃ 以下，避光儲存。
- 【諮詢專線】 0800-005711

衛署藥製字第 G-4424 號  
038117



信隆藥品工業股份有限公司  
Shinlon Pharmaceutical Ind.Co.,Ltd.  
台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號



【品名】感風安膠囊

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、咯痰)。

【用法用量】成人及18歲以上：一次1粒，一日3次。

【藥品劑型及型狀】青色與綠色膠囊，上有 spc782 字樣。

【諮詢電話】0800-005711



綜合感冒製劑 1000Cap.

“信隆”  
**感風安膠囊**

**Kanfonan**  
Capsules "S.L."

SHINLON  
信隆 SPC 藥品

信隆藥品工業股份有限公司  
SHINLON PHARMACEUTICAL IND.CO.,LTD.  
台灣·台南市仁德區中正路三段269號

【有效成分及含量】每膠囊含  
Acetaminophen .....100mg  
Caffeine Anhydrous .....33mg  
Ethoxybenzamide .....167mg  
Tipecidine Hibenazate .....13.3mg  
Chlorpheniramine Maleate .....2.5mg  
dl-Methylephedrine Hydrochloride ...10mg

其他成分  
(賦形劑)：Lactose、Light Anhydrous Silicic Acid、Magnesium Stearate  
(膠囊殼)：Brilliant Blue FCF、Gelatin、Purified Water、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Titanium Dioxide

【適應症】緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、咯痰)。  
【不得使用者】曾因本藥成分引起過敏的人。  
【用法用量】成人及18歲以上一次1粒，一日3次。  
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品  
【諮詢專線】0800-005711

LOT.  
EXP.

衛署藥製字第 G-4424 號  
038117 號



“信隆”  
**感風安** 10粒  
膠囊  
綜合感冒製劑

藥物資訊

有效成分及含量：  
每膠囊含 Acetaminophen.....100 mg  
Caffeine Anhydrous.....33 mg  
Ethoxybenzamide.....167 mg  
Tipecidine Hibenazate.....13.3mg  
Chlorpheniramine Maleate.....2.5 mg  
dl-Methylephedrine Hydrochloride.....10 mg

其他成分  
(賦形劑)：Lactose、Light Anhydrous Silicic Acid、Magnesium Stearate  
(膠囊殼)：Brilliant Blue FCF、Gelatin、Purified Water、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Titanium Dioxide

用途(適應症)：緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、咯痰)。  
不得使用者：曾因本藥成分引起過敏的人

用法用量：  

年齡	每日用量
成人及18歲以上	一次1粒，一日3次

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品  
諮詢專線：0800-005711  
衛署藥製字第 G-4424 號  
038117

LOT :  
EXP :

SPC PIC/S GMP  
信隆藥品工業股份有限公司  
SHINLON PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD.  
臺灣·台南市仁德區中正路三段269號

SPC

