



十全藥品

衛署藥製字第038460號

“十全”必得康錠 20公絲(匹若卡)

Pirocam Tablets 20mg “S.C.” (Piroxicam)

【成 分】：

- 每粒含：Piroxicam..... 20mg
- 化學式：1, 2-benzothiazine-1, 1-dioxide
氮一混環羧醯胺。呈酸性。

【特 性】：

- 非類固醇抗炎劑，同時具止痛和退熱的作用。
- 抑制動物的水腫、紅斑、組織增殖發熱疼痛等現象。
- 外傷手術等不同原因引起的疼痛有速效。
- 吸收容易(口服)半生期36~45小時，每天服用一次即可，在全天中保持穩定血漿濃度，服用5~7天後，再長期服用濃度仍保持穩定不增加，每天約5%尿中排出。
- 此藥易和蛋白質結合。

【適 應 痘】：

類風濕症關節炎、骨關節炎（關節痛、退化性關節炎）、僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風。

【用法・用量】：

- 類風濕性關節炎、骨關節炎、僵直性脊椎炎：初劑量每天20mg用一次，大多數病人的維持量也是每天20mg、有些病人的維持量是每天30mg，分成一次或幾次使用，少量病人的維持量可以減少到每天10mg，長期服用每天30mg以上的劑量會增高胃腸副作用發生可能性。
- 急性肌肉骨骼損傷：最初每天一次40mg，分成一次或幾次服用，然後每天服用20mg，全部治療期間是7到14天。
- 急性痛風：最初每天一次40mg，然後每天給予40mg持續4到6天，每天分成一次或幾次服用。痛風病人不能長期服用本品。
- 本劑須由醫師處方使用。

【注意事項】：

(一)禁 忌 症：會對此藥過敏之患者，不能再使用。

(二)警 告：

對孕婦：雖然動物實驗並未顯示此藥有催畸作用，但孕婦及授乳婦人使用此藥是否安全，尚未確定。本藥作用於前列腺素合成酶(Prostaglandin Biosynthetase)會抑制前列腺素之合成及分泌。其他非類固醇抗炎劑亦具此種作用，已知此作用與服用此類藥品的懷孕動物之難產及延遲分娩有關。

兒 童：兒童在何種情況下可服用此藥及其劑量如何等問題均尚未確定。

(三)注 意：

服用此藥可能會引起消化性潰瘍或胃腸出血。故有胃腸病之患者，服用此藥時須特別注意。少數病人於服用非類固醇抗炎劑（包括本藥）期間，會有血中尿素氮增加之現象。惟此種增加之現象，會止於一定之限度，且停藥後便會恢復正常，又血中尿素氮之增加與血清肌量之增加無關。

(四)不良反應：

常見之副作用除胃腸方面以外，少數病人會出現水腫，尤其是踝部水腫，一般常規檢眼鏡檢查及隙燈檢查，皆未發現病人之眼睛有任何變化，又有些人會發生與胃腸出血無關之血紅素或血球容積減少。亦有人曾經發生肝機能之變化。大多數非類固醇抗炎劑包括本藥，皆會使部分病人之血清轉胺基酶醯(SGPT)增加。

(五)過 量：服用過量時，可對病人採取支持及對症療法。

【賦形劑】：Lactose, Corn Starch, Povidone, Tartrazine, Brilliant Blue FCF, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate.

【包 裝】：2~1,000粒瓶裝。

十全實業股份有限公司

南投市南崙工業區仁和路27號 電 話：(049) 2254221-3
服務專線：(049) 2254615
訂購專線：0800-491666