"永勝"百勝感冒微粒膠囊
Bisun Anti-Cold Micro Capsules "EVEREST"

有效解除感冒的各種症狀！

本品可治療傷風感冒及早服用，避免二次感冒重複感染，無嗜睡副作用，百勝感冒微粒膠囊多重藥效。

流行性感冒由濾過性病毒引起，是傳染性極大的急性疾病，通常會發燒，衰弱，全身酸痛，呼吸道黏膜發炎。

百勝感冒微粒膠囊針對上呼吸道感染引起諸症狀，如流鼻水、鼻塞、打噴嚏、畏冷、發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、肌肉痛、關節疼痛、喀痰等不適之緩解，為有效之綜合感冒膠囊。

【成份】每粒膠囊中含

Acetaminophen……..	100mg
Ethoxybenzamide……	83.33mg
Codeine Phosphate……..	2.40mg
Chlorpheniramine Maleate……..	1.25mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride……	6.67mg
Caffeine Anhydrous……	20mg

【劑型】

"永勝"百勝感冒微粒膠囊是一種膠囊內充填紅色、橘紅色、淡黃色、白色圓型微粒（Pellets）之特殊劑型。

"永勝"百勝感冒微粒膠囊，其微粒膠囊劑型有別於一般劑型，能降低局部刺激性，促進藥物之安定性，具有獨特的藥物釋放性。

【作用】

1.Acetaminophen：具解熱、鎮痛作用，效果迅速。
2.Ethoxybenzamide：為 Salicylamide 的一種衍生物，其鎮痛效果為 Salicylamide 的 2.3 倍，解熱效力強而持久。
3.Codeine Phosphate：為麻醉藥品，對呼吸中樞有強力之鎮靜作用，用於鎮痙鎮咳。
4.Chlorpheniramine Maleate：對於各種過敏性疾患的預防及治療有效，可抑制流鼻水、鼻塞、打噴嚏等過敏性症狀。
5.DL-Methylephedrine Hydrochloride：刺激交感神經，擴張支氣管平滑肌，用於支氣管氣喘、發炎、咳嗽。
6.Caffeine Anhydrous：興奮大腦皮質，增加活動能力，可減低倦睡及疲勞，緩和頭重。

百勝感冒微粒膠囊由於所含成份能迅速解除感冒、流行性感冒和其他呼吸道感染症所引起的多種惱人的症狀。

百勝感冒微粒膠囊對胃無刺激性，解除頭痛和由感冒而帶來的其他疼痛。它的解熱性質亦可降低由呼吸道感染症所引起發燒，同時能治療感冒所引起的鼻塞；迅速收縮充血之鼻黏膜，停止流鼻水而促進鼻道的通暢，恢復改善，舒適的呼吸，對於打噴嚏，過敏性鼻炎等症狀也有迅速有效的治療效果。

百勝感冒微粒膠囊能降低過敏性咳嗽的次數和嚴重性，對於支氣管哮喘的病人，它的止咳作用及有效祛痰劑，能解除呼吸道黏膜不適所引起的咳嗽。

百勝感冒微粒膠囊的完整配方，協助解除感冒所引起的疲勞，促進清醒，使您倍感舒適。

【適應症】

感冒諸症狀（頭痛、發熱、鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、惡寒、關節痛、肌肉痛）之緩解。

【用法・用量】

成人（15 歲以上），一次二粒，8 歲以上，未滿 15 歲，一次一粒，一天三次，飯後服用。
本品用於兒童，僅限臨床效益大於風險時使用。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【副作用】

1.本品含 Acetaminophen，偶有過敏反應，在建議劑量下使用少有副作用發生。長期服用超大劑量會引起肝毒性，在兒童急性中毒劑量小於 150mg/Kg。
2.本品含 Chlorpheniramine Maleate 有嗜睡、口乾、倦怠感、視覺模糊、錯亂、小便困難、心跳加快現象。
3.本品含 Caffeine Anhydrous 有神經質、興奮、睡不著與心搏加快現象。
本品含 DL-Methylephedrine Hydrochloride 有暈眩、神經質、燥動、顫抖、呼吸困難、虛弱、臉色蒼白現象。

【警語及注意事項】

1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
(1)孕婦及授乳婦不建議自行使用。
(2)服用本藥時不得併服其他藥品。
4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
6.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
(1)6 歲以下不建議自行使用。
(2)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
7.患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
8.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
9.若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
10.吸煙、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本類藥品。
11.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
12.不要服用本藥超過七天。
13.服用本藥後，如果症狀沒有改善，或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
14.服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
15.懷孕第三期婦女得不得使用。
16.服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
17.除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
18.本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
19.本藥含 Ephedrine hydrochloride，使用於 12 歲以下患者之前，請先詢問醫師。
20.應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。
21.為了避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。
22.12 歲以下兒童不建議使用。
23.本品因含麻醉藥品，長期使用易致成癮。
24.①早產兒、1 歲以下嬰兒及 1-2 歲幼兒，不建議使用；②2-12 歲兒童，依年齡減量使用；③肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。
25.肝毒性：
①使用 Acetaminophen (paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 Acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 Acetaminophen 成分之藥品。
②過量服用 Acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 Acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。
③有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 Acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 Acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 Acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 Acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
26.與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 Acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。
27.過量：
①服用過量 Acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
②本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
③Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。
28.過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 Acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 Acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。
29.嚴重皮膚反應：使用 Acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病（Acute Generalized Exanthematous Pustulosis , AGEP）、史蒂文生氏-強生症候群（Stevens - Johnson Syndrome, SJS）和毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis, TEN）。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。
30.本藥含 Ethoxybenzamide 應注意下列事項：
①除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
1. 本藥不得使用於 12 歲以下兒童，亦不得使用於成人之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病－雷氏症候群(Reye's Synarome)有相關性。
2. 曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。
② 蠶豆症 (6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不得服用本藥。
③可能引起胃腸不適、胃腸出血、皮膚出疹、出血傾向、氣喘、耳鳴等不適症狀。
31. 苯酮尿症（Phenylketonuria）患者不得服用本類藥品。

【禁忌】

兒童扁桃腺及腺樣體切除術後止痛、已知 CYP2D6 快速藥物代謝者(ultra-rapid metabolisers)及哺乳婦女。

【賦形劑】Talc、Hydroxy Propyl Cellulose、Sugar Spheres、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose、Polyethylene Glycol 6000、Erythrosine Aluminum Lake、Food Color Yellow NO.4 Aluminum Lake、FD&C Yellow NO.5 Aluminum Lake、FD&C Red NO.40 Aluminum Lake、Titanium Dioxide。

【硬空膠囊】主成分:Gelatin。賦形劑:Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、Brilliant Blue FCF、New Coccin。

【包裝】12~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】25℃以下、防濕、遮光保存。

衛署藥製字第 038473 號

永勝藥品工業股份有限公司
EVEREST
嘉義頭橋工業區工業三路 6-3 號
諮詢電話:05-2218686 (代表號)