

SIZE:135*80mm

正面

CGMP優良藥品
GMP G-4719

"聯邦"若 福點眼液 3毫克/毫升
(諾弗洛沙辛)
Norflo Ophthalmic Solution 3mg/ml "Union"
(Norfloxacin)

成 分 : Each ml contains:
Norfloxacin.....3.0mg

賦 形 劑 :

Sodium Acetate Trihydrate, Sodium chloride, Edetate Disodium, Benzalkonium Chloride, Water for Injection

作 用 :

1. 抗菌作用:

本劑係Fluorquinolone系合成抗茵劑，對Norfloxacin具有感受性的葡萄球菌屬，鏈球菌屬，肺炎球菌，腸球菌屬，棒狀桿菌屬(Corynebacterium)，細球菌屬(Micrococcus)，桿菌屬(Bacillus)，Branhamella catarrhalis，克白雷氏桿菌屬(Klebsiella)，腸內桿菌屬(Enterobacter)，鋸桿菌屬(Serratia)，變形桿菌屬(Proteus)，假單胞菌屬(Pseudomonas)，綠膿桿菌，黃質菌屬(Flavobacterium)嗜血桿菌屬(Haemophilus influenzae)等革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌均具有廣大抗菌範圍，對外眼部之感染症之治療具有卓越效果。

2. 作用機序:

本劑係對使細菌高次構造變換之DNA Gyrase加以作用，阻礙DNA之複製，具殺菌性的作用。

3. 體內藥物動態:

血中濃度一健康成年人之眼睛以本劑一次二滴，一日四次，點眼，投與14日，最終投與日之第三次點藥後一小時之血中濃度在測定限界值(0.005ug/ml)以下。
眼內移行—眼睛手術之患者在手術前三十

衛署藥製字第038687號

反面

分鐘至前三小時，數次點眼時之前房水中濃度，在點眼後九十分鐘呈現出最高值(0.36ug/ml)。

適 應 痘 :

對Norfloxacin具有感受性之感染症：眼瞼炎，麥粒腫，淚囊炎，結膜炎，瞼板腺炎，角膜炎，術後感染症。

用法用量 :

一次一滴，一日三次，點眼。依症狀輕重適宜增減之。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項 :

1. 本劑請勿長期間使用。

2. 本劑僅用於點眼使用。

3. 對Norfloxacin或Quinolone系合成抗茵劑，有過敏症既往歷之患者，請勿投與本劑。

副 作 用 :

1. 過敏症：若有過敏症狀發生時，立即停止投與。

2. 其 它：偶有刺激等症狀，或引起卡他性結膜炎，但極少發生。

貯 存：室溫25°C以下避光保存。

警 語：本劑請勿長時間置於低溫場所。

包 裝：5ml×50Bt. (塑膠瓶裝)

5ml×60Bt. (塑膠瓶裝)



聯邦化學製藥股份有限公司
新北市蘆洲區正和街19號

01-15-07-021