胃、十二指腸潰瘍治療劑　　藍色錠

衛署藥製字第 038764 號 GMP-G-3573 號

"明德" 恩胃錠 200 毫克(希每得定)

N-Way Tablets 200mg (Cimetidine) "MEIDER"

[前　　言]: 本劑主成分 Cimetidine 直接阻斷 Histamine 在胃壁細胞上的 H-接受體，有效抑制因組織胺、胰島素、食物、咖啡鹼、胃泌素(Gastrin)，迷走神經等引起之胃酸分泌。

[成　　份]: 每錠含有 Cimetidine..... 200mg

[特　　點]:
1 迅速有效抑制過度胃酸分泌，解除疼痛。
2 促進潰瘍癒合，減少住院開刀之必要。
3 可以與任何胃腸藥配合使用，無臨床禁忌。
4 口服與注射有同等之效果。
5 對胃潰瘍、十二指腸潰瘍之治癒率高。

[適 應 症]: 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、消化性食道炎、上胃腸道糜爛或潰瘍引起之出血、再發生性潰瘍、孔性潰瘍、膽囊纖維變性併發有胰臟功能不全時之補助療法。

[用法用量]: 一日 5 錠，飯後各一錠，睡前 2 錠，可因病情症狀酌量使用，但最高不得超過一日 12 錠。

[類　　別]: 本藥須由醫師處方使用。

[注意事項]:
1 本品會產生微弱抗雄性素作用，但對交媾行為及受妊力無損，治療長達一個月或以上之病人出現乳房增殖，可能是因此種作用引起，本劑療法之症候性反應不排除惡性病變出現之可能性。
2 用於老年或重症病人，偶而出現可逆性迷惑情形，多半係因用藥過量所致，故於停藥 48 小時後即可恢復。
3 藥物交互作用:本時給予本劑發現會加強 Warfarin 類抗凝血劑作用，因此當同時給藥劑量，同時使用本劑病人報告其 Benzodiazepine 衍生物之半生期延長，但臨床意義未明，接受本劑治療病人若同時使用抗代謝劑，烷化劑或其他藥物及/或已知可引起嗜中性球減少之療法時，曾有報告出現白血球減少，包括粒性白血球缺乏。
4 用於孕婦:從動物實驗得知本劑會通過胎盤障礙，故不得使用於孕婦或有懷孕可能之婦女，除非醫師判斷預期之利益超過可能之危險性。
5 授乳婦:本劑分泌於人乳中一般而言病人用藥期間不得授乳。
6 小兒:本劑不推薦用於 16 歲以下兒童，除非醫師判斷預期之利益超過可能之危險性
7 不良反應:極少數病人會有輕度一過性下痢、肌病、眩暈及發疹，曾有報告指出病例復發時再度用藥出現頭痛、眩暈及震顫。

[包　　裝]: 10～1000 錠塑膠瓶裝。

[儲　　藏]: 30℃以下貯存。

[賦形劑]: Calcium Carboxymethylcellulose、Lactose、Magnesium Stearate、Povidone K-30、Sodium Lauryl Sulfate、Potato Starch、Talc、Brilliant Blue FCF

明德製藥股份有限公司
桃園市楊梅區民富路二段 360 號
Made in Taiwan