

1000 Tabs.

[Indications]

For the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, acute painful shoulder (acute subacromial bursitis/Suprpectorad tendinitis), and acute gouty arthritis.

[Dosage and Administration]

It should be administered orally with food. The usual dosage is one tablet twice a day. The maximum dose is 400mg per day.

To be dispensed on physician's prescription.

本廠符合國際 **PIC/S GMP** 標準
(審核證號:AFJ003501號)



41715168 104335



非類固醇・非比林系・消炎・鎮痛劑
Nonsteroidal Antiinflammatory/Analgesic Agent

速快®
(蘇林達克)
Soliky®
(Sulindac) Tablets 200mg

每錠中含(Each tab. contains):
Sulindac.....200mg



永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號
產品諮詢專線：0800-012-679

SKT 2177323-004

衛署藥製字第038956號

[適應症]

骨關節炎、風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、急性疼痛性肩關節疾病（急性肩峰下滑囊炎、上肩胛肌腱炎）及急性痛風性關節炎。

[用法・用量]

本藥應與食物併服。
一般劑量為每次一錠，每日服用二次。

每日最高總劑量400mg。

本藥須由醫師處方使用。

• 本藥應置於小兒伸手不及處。

• 使用前請詳閱說明書。

• 於25°C以下，避光儲存。

• 請在有效期限內使用。

本藥適用藥害救濟制度