“瑞安” 嬌膚爽

（皮質醇）

乳膏
10 毫克/公克

“Purzer”

Hydrosone

(Hydrocortisone)

Cream
10 mg/ g

瑞安大藥廠股份有限公司 **PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

PIC/S GMP 衛署藥製字第 039088 號 GMP優良藥品 G-4937 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

【成　分】每公克含：
Hydrocortisone.....10 mg
賦形劑：N, N-Dimethylformamide, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Tefose 63 (Propylene Glycol Stearate, Ethylene Glycol Stearate), Propyl Paraben, Methyl Paraben, Glycerin, HCS Flavour, Sodium Hydroxide

【適應症】
濕疹或皮膚炎。

【用法用量】
依情況一天使用2到4次，使用時將本劑敷於患處即可。

【藥理作用】
局部使用之類固醇具有抗發炎、止癢及血管收縮作用，到目前為止其抗發炎的作用機轉仍不清楚，但在人類其血管收縮強度與臨床藥效成正比，在其藥物動力學方面，有許多因素可影響其經由表皮吸收的量，諸如：選用的賦形劑，表皮的完整性及密合包紮法的使用等。在發炎、或有其它疾病的皮膚、或使用包紮療法，均可增加類固醇之經皮吸收量；包紮療法可用於治療頑強性皮膚疾病及牛皮癬。
局部類固醇一旦經皮吸收後，其藥物動力學路徑與全身投予者相似，類固醇會有不同程度的血漿蛋白質結合量，其主要由肝臟代謝，由腎臟排出體外，少量的類固醇或其代謝物會分佈到膽汁。

【禁忌】
對本劑過敏者禁用本劑。

【注意事項】
1.假如感到刺激，即停止使用本劑，改用其它適當的治療。
2.有感染現象發生者，應改用他種抗黴菌抗細菌的製劑，假如良好的反應未能迅速發生，本劑將不可使用，直到感染已適當的控制。
3.假如對身體大部份作藥物治療或實施閉合技術，會促進皮質酮作系統性的吸收，這應特別注意。
4.雖然未有報告指出孕婦局部使用類固醇有不良的反應，但孕婦方面使用的安全性也未建立。因此，這類的藥物不可大量或長期廣泛的使用於懷孕的患者。
5.本品不可用於眼睛或用於眼睛的周圍。
6.除非藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇或非類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。

【警語】
類固醇
1.對藥物各成分過敏者不得使用。
2.小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
3.癬類或其它皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
4.臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
5.皮膚的黴菌感染有時不易與其它皮膚炎區分，誤用類固醇會使病性惡化並造成日後診斷及治療之困難。

【副作用】
極少發生下列的副作用，但使用包紮療法時可能較明顯：灼燒感、搔癢、刺激感、乾燥、毛囊炎、多毛症、痤瘡狀疹等。

【儲存條件】
室溫貯藏。

【包裝種類】
1000公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝。

瑞安大藥廠股份有限公司
地　　址：台北市松山區光復南路1號12樓之2
製 造 廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠
廠　　址：桃園市觀音區草漯里大同一路26號
服務電話：(02)2766-0887

C0106302