開封後請速將拉鍊密閉

開封後請速將拉鍊密閉

“真富”

外用

痛得貼藥膠布

Tondedel PAP”Z.F” (Indomethacin)



水性

冷感

肌肉疼痛/關節炎

背部/腰部/肩膀疼痛

消炎鎮痛

6 枚入

10cmx14cm

符合PIC/S GMP標準

4 712831 955393

衛署藥製字第039310號　　開封後請速將拉鍊密閉

"真富" 痛得貼藥膠布 外用

Tondedel PAP" Z.F" (Indomethacin)

藥物資訊
成分：每片14gm膏體(10cm×14cm)含： **有效成分及含量：Indomethacin 70mg/片** 其他成分(賦形劑)：Purified Water, Gelatin, Tartaric Acid, Alcohol,L-Menthol, Polysorbate 80, Sorbitan Sesquioleate, Glycerin, Kaolin, Titanium Oxide, Methyl Paraben, Sodium Polyacrylate, Sodium Carboxymethylcellulose, Sorbitol Solution70%, Polyacrylic acid, Nikasol TS-620
用途(適應症)：暫時緩解局部疼痛。
不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。
用法用量：一日二次，貼於患處。
類　　別：醫師藥師藥劑生指示藥品。
諮詢專線：0800-600-388

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：
　(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
　(一)2歲以下兒童。
　(二)曾對藥品或化妝品有過敏症狀(皮膚起疹子、紅斑、搔癢等)。

三、其他使用上注意事項：
　(一)請勿用於：眼睛四周，有黏膜的地方(如眼睛、生殖道)、出現紅疹或有搔癢的地方、傷口處。
　(二)兒童(12歲以下)必須在成人的協助下使用。
　(三)本藥必須置於兒童(12歲以下)拿不到的地方。
　(四)避免陽光直射，保存在室內乾燥的地方。
　(五)為了確保品質，未使用的貼片應置於袋內，並將拉鍊密閉。
　(六)本藥可能隱蔽細菌感染之病徵，在臨床報告未充分明瞭之前，禁止兒童(12歲以下)使用。

【警語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫生藥師或藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	偶有搔癢、灼熱感、局部發紅。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
　(一)發生視覺問題(視力模糊、視力減退)或白血球減少症(出現症狀：發燒、喉嚨痛)或血小板減少症(出現症狀：出血，包括牙齦流血，皮膚有紫斑或點狀紅斑，大便有血或解黑便)或顆粒性白血球缺乏病(出現症狀：發燒、喉嚨痛)或胃腸出血(血便)或尿血症(尿液中有血(絲))。

製造批號：

保存期限：



【包　　裝】：14gm(10cmx14cm)/片，鋁箔袋盒裝。

委託者：真富有限公司
台南市扁豆區謝厝寮16號1樓
服務電話(上班時間:0800-600-388)
製造廠：德山製藥股份有限公司
嘉義縣民雄工業區中山路38號
TEL：(05)2209897