廣效性抗菌劑

OCT4-003
衛署藥製字第039523號

YSP

歐信®
（歐弗洒欣）

膜衣錠 400毫克

Ofcin®
(Ofloxacin)

Film Coated Tablets 400mg

3.98cm

自從1962年發現第一種Quinolone類抗菌劑-Nalidixic acid以來，臨床之抗微生物療法便邁入了新紀元，由於這些傳統性Quinolone之抗菌譜狹窄及容易快速誘發抗藥性，故醫藥界便積極尋求另一種新型之抗菌劑，以利臨床各類型感染之廣泛治療作用。歐信Ofcin(Ofloxacin)錠爲一種新型可供口服之Fluoroquinolone類抗菌劑，由於化學構造的改變，促使其具有更寬廣之抗菌譜，更低的抗藥性、更佳的動力學特性及更輕微的副作用。此外，針對金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)之抗菌效能而言，Ofloxacin誘發抗藥性之機率亦較其他Fluoroquinolone爲低。綜合上述，歐信Ofcin(Ofloxacin)錠，應可爲臨床常見之各種感染性疾患，提供一種全新的治療選擇。

【成　　分】每錠中含：

Ofloxacin.....400mg

【賦　形　劑】

Lactose、Hydroxypropyl Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Polyethylene Glycol 6000、Talc、Methylhydroxypropylcellulose、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF。

【作　　用】

1. 本藥爲一廣效性抗菌劑，可有效抑制臨床上常見之革蘭氏陽性菌、陰性菌及厭氣菌，且在等於或稍高於MIC值時即具有殺菌的效能，其作用機序主要爲抑制病原菌之DNA gyrase而中止菌體DNA之合成及修復，繼而發揮優異的抗菌效果。
2. 依研究顯示，對本藥特具敏感性之有效菌種包括，葡萄球菌屬(Staphylococcus sp.)、化膿鏈球菌(Streptococcus pyogens)、溶血性鏈球菌(Hemolytic streptococci)、腸球菌(Enterococci)、肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)、奈瑟氏淋病雙球菌(Neisseria gonorrhoeae)、大腸桿菌(E. coli)、檸檬酸菌屬(Citrobacter sp.)、志賀氏桿菌屬(Shigella sp.)、克雷氏肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae)、腸內桿菌屬(Enterobacter sp.)、沙雷氏化膿菌屬(Serratia sp.)、變形桿菌屬(Proteus sp.)、綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)、流行性感冒嗜血桿菌(Haemophilus influenzae)、Acinetobacter sp.、食中毒曲菌屬(Campylobacter sp.)、及披衣菌(Chlamydia trachomatis)。
3. 本藥經口服投與後1至2小時內可達最高血清中濃度，且可廣泛分佈於體內各組織及體液包括：水疱、子宮頸、肺組織、卵巢、前列腺、前列腺組織、皮膚及痰液等。蛋白結合率約爲32%。
4. 本藥經口服投與後，於穩定狀態下半衰期約爲9小時，70-80%之投與劑量可於36小時內經由腎臟，以未變化型態排泄，而僅有5%以下之投與劑量以Desmethyl或N-oxide之代謝物由尿液中排除。此外，約有4-8%之Ofloxacin可經由糞便排除。
5. 本藥之吸收情形殆不受年齡之影響，而其抗菌效果亦不受青黴素酶生成之影響。

【適　應　症】

有感受性細菌引起之呼吸道感染症、耳鼻喉科感染症、泌尿道感染症、子宮內感染、子宮頸管炎、子宮附屬器炎、細菌性赤痢、腸炎、巴多林氏腺炎、輕度及中度皮膚軟組織表淺性感染。

【用法．用量】

一般成人劑量爲每次200-400mg，每12小時服用一次，依感染症之種類及症狀適宜增減用量。
本藥須由醫師處方使用。

【警　　語】

本藥品具有使重症肌無力惡化之風險，具有重症肌無力患者應避免使用。

【注 意 事 項】

1. 曾對本藥或其他Quinolone類抗菌劑發生過敏病歷之患者禁用之。
2. 腎功能不全患者請慎重投與本藥。
3. 服用本藥期間，患者應注意以下事項：
(1) 避免過度於日光下曝曬。
(2) 大量補充水分。
(3) 投藥前後二小時內，請勿服用礦物質、含鐵或礦物質之維生素或含鎂、鋁之制酸劑。
(4) 請勿與食物併服。
(5) 由於服用本藥後，可能會發生眩暈或頭重腳輕現象，故請勿開車或操作具危險性之機械。
(6) 有發疹、搔癢等過敏症狀出現者應停止使用。
4. 本藥使用於18歲以下之兒童、孕婦、授乳婦之安全性及有效性尚未確立，故不建議使用。
5. 服用本藥期間可能發生之副作用包括，噁心、頭痛、失眠、眩暈、下痢、嘔吐、胃腸不適、女外生殖器搔癢、陰道炎、陰道分泌物異常、疲勞、嗜眠、皮膚疹、味覺不良、口乾、睡眠失調、視覺異常、食慾減退、神經質、搔癢感、發熱、胸痛及軀體疼痛等。
6. 副作用報告顯示Floroquinolone類抗菌劑可導致肌腱炎或肌腱斷裂，若有肌腱疼痛、發炎、斷裂之情形，應立即停藥。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包　　裝】

2～1000錠塑膠瓶裝、罐裝、鋁箔盒裝。

YUNGSHIN®

永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2148838